

表 4144 PET Cr D/P比 残存腎機能(一日尿量)(mL/日)別 (腹膜透析患者)

残存腎機能 (一日尿量)	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	72 (12.8)	226 (40.1)	206 (36.6)	59 (10.5)	563 (100.0)	389	952	0.63	0.15
100～ (%)	39 (7.7)	150 (29.7)	231 (45.7)	85 (16.8)	505 (100.0)	304	809	0.68	0.13
400～ (%)	54 (9.0)	207 (34.6)	240 (40.1)	97 (16.2)	598 (100.0)	425	1,023	0.66	0.14
800～ (%)	43 (8.1)	199 (37.7)	214 (40.5)	72 (13.6)	528 (100.0)	371	899	0.66	0.13
1200～ (%)	31 (9.1)	139 (40.8)	133 (39.0)	38 (11.1)	341 (100.0)	198	539	0.65	0.12
1600～ (%)	23 (10.7)	70 (32.7)	94 (43.9)	27 (12.6)	214 (100.0)	93	307	0.67	0.14
合計 (%)	262 (9.5)	991 (36.0)	1,118 (40.7)	378 (13.8)	2,749 (100.0)	1,780	4,529	0.66	0.14
記載なし (%)	50 (14.3)	147 (42.1)	122 (35.0)	30 (8.6)	349 (100.0)	4,063	4,412	0.63	0.13
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14
平均	654.94	670.28	667.49	632.93	662.55	624.55	647.61		
標準偏差	639.71	593.73	589.09	536.52	588.71	561.95	578.57		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査