

表 4148 PET Cr D/P比 PD透析液交換方法別（腹膜透析患者）

PD透析液交換方法	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
完全手動式	93 (%)	421 (40.1)	410 (39.0)	126 (12.0)	1,050 (100.0)	710	1,760	0.65	0.13
バッグ交換デバイス(紫外線)	154 (%)	527 (33.8)	635 (40.7)	244 (15.6)	1,560 (100.0)	1,315	2,875	0.66	0.14
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	51 (%)	146 (38.5)	157 (41.4)	25 (6.6)	379 (100.0)	338	717	0.63	0.13
バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	4 (%)	11 (30.6)	18 (50.0)	3 (8.3)	36 (100.0)	44	80	0.65	0.17
合計	302 (%)	1,105 (36.5)	1,220 (40.3)	398 (13.2)	3,025 (100.0)	2,407	5,432	0.66	0.14
不明	9 (%)	25 (49.0)	12 (23.5)	5 (9.8)	51 (100.0)	56	107	0.59	0.17
記載なし	1 (%)	8 (36.4)	8 (36.4)	5 (22.7)	22 (100.0)	3,380	3,402	0.68	0.13
総計	312 (%)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査