

表 4150 PET Cr D/P比 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)別(腹膜透析患者)

2014年中の出口 部感染発症率(回 /1患者・年)	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0	252	847	935	305	2,339	1,921	4,260	0.65	0.14
(%)	(10.8)	(36.2)	(40.0)	(13.0)	(100.0)				
1.0～	30	154	177	61	422	198	620	0.67	0.14
(%)	(7.1)	(36.5)	(41.9)	(14.5)	(100.0)				
2.0～	13	45	45	17	120	72	192	0.65	0.17
(%)	(10.8)	(37.5)	(37.5)	(14.2)	(100.0)				
3.0～	3	18	21	6	48	24	72	0.66	0.11
(%)	(6.3)	(37.5)	(43.8)	(12.5)	(100.0)				
4.0～	4	9	13	5	31	17	48	0.68	0.14
(%)	(12.9)	(29.0)	(41.9)	(16.1)	(100.0)				
5.0～	2	25	21	4	52	37	89	0.65	0.11
(%)	(3.8)	(48.1)	(40.4)	(7.7)	(100.0)				
合計	304	1,098	1,212	398	3,012	2,269	5,281	0.66	0.14
(%)	(10.1)	(36.5)	(40.2)	(13.2)	(100.0)				
不明 記載なし	8	40	28	10	86	3,574	3,660	0.64	0.12
(%)	(9.3)	(46.5)	(32.6)	(11.6)	(100.0)				
総計	312	1,138	1,240	408	3,098	5,843	8,941	0.65	0.14
(%)	(10.1)	(36.7)	(40.0)	(13.2)	(100.0)				
平均	0.32	0.47	0.44	0.41	0.43	0.35	0.40		
標準偏差	0.88	1.25	1.12	0.96	1.13	1.23	1.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査