

表 4155 PET Cr D/P比 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	0.5未満	0.5~	0.65~	0.81~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	132 (9.8)	501 (37.2)	546 (40.5)	168 (12.5)	1,347 (100.0)	2,785	4,132	0.65	0.14
腹膜透析 (APD) (%)	82 (9.7)	288 (34.2)	343 (40.7)	130 (15.4)	843 (100.0)	1,493	2,336	0.67	0.14
腹膜透析 (CCPD) (%)	25 (7.7)	111 (34.4)	150 (46.4)	37 (11.5)	323 (100.0)	397	720	0.66	0.13
合計 (%)	239 (9.5)	900 (35.8)	1,039 (41.3)	335 (13.3)	2,513 (100.0)	4,675	7,188	0.66	0.14
記載なし (%)									
総計 (%)	239 (9.5)	900 (35.8)	1,039 (41.3)	335 (13.3)	2,513 (100.0)	4,675	7,188	0.66	0.14

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査