

表 4159 PET Cr D/P比 透析歴(年)別 (腹膜透析単独患者)

| 透析歴  | 0.5未満  | 0.5～    | 0.65～  | 0.81～  | 合計      | 記載なし  | 総計    | 平均   | 標準偏差 |
|------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|------|------|
| 2年未満 | 105    | 350     | 453    | 167    | 1,075   | 2,287 | 3,362 | 0.67 | 0.14 |
| (%)  | (9.8)  | (32.6)  | (42.1) | (15.5) | (100.0) |       |       |      |      |
| 2年～  | 91     | 368     | 409    | 118    | 986     | 1,596 | 2,582 | 0.66 | 0.13 |
| (%)  | (9.2)  | (37.3)  | (41.5) | (12.0) | (100.0) |       |       |      |      |
| 5年～  | 35     | 151     | 158    | 43     | 387     | 614   | 1,001 | 0.65 | 0.13 |
| (%)  | (9.0)  | (39.0)  | (40.8) | (11.1) | (100.0) |       |       |      |      |
| 10年～ | 7      | 20      | 13     | 6      | 46      | 125   | 171   | 0.61 | 0.16 |
| (%)  | (15.2) | (43.5)  | (28.3) | (13.0) | (100.0) |       |       |      |      |
| 15年～ | 1      | 8       | 4      |        | 13      | 32    | 45    | 0.61 | 0.08 |
| (%)  | (7.7)  | (61.5)  | (30.8) |        | (100.0) |       |       |      |      |
| 20年～ |        | 1       | 1      | 1      | 3       | 8     | 11    | 0.75 | 0.15 |
| (%)  |        | (33.3)  | (33.3) | (33.3) | (100.0) |       |       |      |      |
| 25年～ |        | 1       | 1      |        | 2       | 2     | 4     | 0.69 | 0.09 |
| (%)  |        | (50.0)  | (50.0) |        | (100.0) |       |       |      |      |
| 30年～ |        | 1       |        |        | 1       | 5     | 6     | 0.58 |      |
| (%)  |        | (100.0) |        |        | (100.0) |       |       |      |      |
| 35年～ |        |         |        |        |         | 2     | 2     |      |      |
| (%)  |        |         |        |        |         |       |       |      |      |
| 40年～ |        |         |        |        |         |       |       |      |      |
| (%)  |        |         |        |        |         |       |       |      |      |
| 合計   | 239    | 900     | 1,039  | 335    | 2,513   | 4,671 | 7,184 | 0.66 | 0.14 |
| (%)  | (9.5)  | (35.8)  | (41.3) | (13.3) | (100.0) |       |       |      |      |
| 不明   |        |         |        |        |         | 4     | 4     |      |      |
| (%)  |        |         |        |        |         |       |       |      |      |
| 記載なし |        |         |        |        |         |       |       |      |      |
| (%)  |        |         |        |        |         |       |       |      |      |
| 総計   | 239    | 900     | 1,039  | 335    | 2,513   | 4,675 | 7,188 | 0.66 | 0.14 |
| (%)  | (9.5)  | (35.8)  | (41.3) | (13.3) | (100.0) |       |       |      |      |
| 平均   | 2.55   | 2.89    | 2.46   | 2.18   | 2.59    | 2.49  | 2.52  |      |      |
| 標準偏差 | 2.77   | 3.13    | 2.61   | 2.55   | 2.82    | 3.26  | 3.11  |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査