

表 4164 PET Cr D/P比 一日透析液使用量(L/日)別（腹膜透析単独患者）

一日透析液使用量	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満	9	16	16	9	50	56	106	0.65	0.17
(%)	(18.0)	(32.0)	(32.0)	(18.0)	(100.0)				
2～	20	57	66	28	171	200	371	0.65	0.15
(%)	(11.7)	(33.3)	(38.6)	(16.4)	(100.0)				
4～	61	192	219	71	543	443	986	0.66	0.13
(%)	(11.2)	(35.4)	(40.3)	(13.1)	(100.0)				
6～	74	319	351	113	857	636	1,493	0.66	0.13
(%)	(8.6)	(37.2)	(41.0)	(13.2)	(100.0)				
8～	44	212	254	76	586	455	1,041	0.66	0.13
(%)	(7.5)	(36.2)	(43.3)	(13.0)	(100.0)				
10～	16	54	72	20	162	111	273	0.66	0.13
(%)	(9.9)	(33.3)	(44.4)	(12.3)	(100.0)				
12～	8	22	33	11	74	55	129	0.64	0.19
(%)	(10.8)	(29.7)	(44.6)	(14.9)	(100.0)				
合計	232	872	1,011	328	2,443	1,956	4,399	0.66	0.14
(%)	(9.5)	(35.7)	(41.4)	(13.4)	(100.0)				
記載なし	7	28	28	7	70	2,719	2,789	0.65	0.12
(%)	(10.0)	(40.0)	(40.0)	(10.0)	(100.0)				
総計	239	900	1,039	335	2,513	4,675	7,188	0.66	0.14
(%)	(9.5)	(35.8)	(41.3)	(13.3)	(100.0)				
平均	6.36	6.61	6.73	6.54	6.63	6.41	6.53		
標準偏差	2.73	2.47	2.55	2.52	2.54	2.89	2.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査