

表 4169 PET Cr D/P比 PD透析液交換方法別（腹膜透析単独患者）

PD透析液交換方法	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
完全手動式	69 (%)	339 (40.0)	338 (39.9)	102 (12.0)	848 (100.0)	574	1,422	0.65	0.13
バッグ交換デバイス(紫外線)	113 (%)	410 (32.8)	528 (42.2)	200 (16.0)	1,251 (100.0)	1,071	2,322	0.67	0.14
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	46 (%)	119 (36.2)	141 (42.9)	23 (7.0)	329 (100.0)	278	607	0.64	0.13
バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	3 (%)	6 (22.2)	16 (59.3)	2 (7.4)	27 (100.0)	39	66	0.66	0.17
合計	231 (%)	874 (35.6)	1,023 (41.7)	327 (13.3)	2,455 (100.0)	1,962	4,417	0.66	0.14
不明	7 (%)	19 (51.4)	8 (21.6)	3 (8.1)	37 (100.0)	39	76	0.58	0.18
記載なし	1 (%)	7 (33.3)	8 (38.1)	5 (23.8)	21 (100.0)	2,674	2,695	0.68	0.13
総計	239 (%)	900 (35.8)	1,039 (41.3)	335 (13.3)	2,513 (100.0)	4,675	7,188	0.66	0.14

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査