

表 4172 PET Cr D/P比 残腎Kt/V別（腹膜透析単独患者）

残腎Kt/V	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.1未満	25	79	96	27	227	32	259	0.64	0.17
(%)	(11.0)	(34.8)	(42.3)	(11.9)	(100.0)				
0.1～	25	118	154	62	359	36	395	0.68	0.13
(%)	(7.0)	(32.9)	(42.9)	(17.3)	(100.0)				
0.4～	27	170	175	66	438	48	486	0.67	0.13
(%)	(6.2)	(38.8)	(40.0)	(15.1)	(100.0)				
0.8～	33	123	112	36	304	30	334	0.65	0.13
(%)	(10.9)	(40.5)	(36.8)	(11.8)	(100.0)				
1.2～	13	59	70	20	162	19	181	0.66	0.13
(%)	(8.0)	(36.4)	(43.2)	(12.3)	(100.0)				
1.7～	7	21	16	2	46	4	50	0.61	0.10
(%)	(15.2)	(45.7)	(34.8)	(4.3)	(100.0)				
2.0～	3	18	9	4	34	3	37	0.63	0.12
(%)	(8.8)	(52.9)	(26.5)	(11.8)	(100.0)				
2.4～	2	9	7	4	22	4	26	0.68	0.14
(%)	(9.1)	(40.9)	(31.8)	(18.2)	(100.0)				
合計	135	597	639	221	1,592	176	1,768	0.66	0.13
(%)	(8.5)	(37.5)	(40.1)	(13.9)	(100.0)				
記載なし	104	303	400	114	921	4,499	5,420	0.65	0.14
(%)	(11.3)	(32.9)	(43.4)	(12.4)	(100.0)				
総計	239	900	1,039	335	2,513	4,675	7,188	0.66	0.14
(%)	(9.5)	(35.8)	(41.3)	(13.3)	(100.0)				
平均	0.73	0.70	0.62	0.60	0.66	0.69	0.66		
標準偏差	0.72	0.69	0.59	0.66	0.65	0.82	0.67		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査