

表 4174 PET Cr D/P比 総透析量別（腹膜透析単独患者）

総透析量	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.1未満 (%)	1 (50.0)		1 (50.0)		2 (100.0)	6	8	0.34	0.48
0.1～ (%)		7 (23.3)	14 (46.7)	9 (30.0)	30 (100.0)	4	34	0.73	0.12
0.4～ (%)	6 (14.3)	16 (38.1)	17 (40.5)	3 (7.1)	42 (100.0)	3	45	0.63	0.14
0.8～ (%)	8 (11.3)	24 (33.8)	29 (40.8)	10 (14.1)	71 (100.0)	1	72	0.63	0.21
1.2～ (%)	34 (8.9)	137 (35.8)	151 (39.4)	61 (15.9)	383 (100.0)	34	417	0.67	0.13
1.7～ (%)	28 (6.5)	166 (38.7)	178 (41.5)	57 (13.3)	429 (100.0)	44	473	0.67	0.12
2.0～ (%)	33 (9.5)	133 (38.4)	132 (38.2)	48 (13.9)	346 (100.0)	32	378	0.66	0.13
2.4～ (%)	9 (6.3)	57 (40.1)	58 (40.8)	18 (12.7)	142 (100.0)	10	152	0.66	0.13
2.8～ (%)	13 (10.2)	50 (39.4)	52 (40.9)	12 (9.4)	127 (100.0)	15	142	0.65	0.12
合計 (%)	132 (8.4)	590 (37.5)	632 (40.2)	218 (13.9)	1,572 (100.0)	149	1,721	0.66	0.13
記載なし (%)	107 (11.4)	310 (32.9)	407 (43.3)	117 (12.4)	941 (100.0)	4,526	5,467	0.65	0.14
総計 (%)	239 (9.5)	900 (35.8)	1,039 (41.3)	335 (13.3)	2,513 (100.0)	4,675	7,188	0.66	0.14
平均	1.87	1.95	1.89	1.90	1.91	2.06	1.93		
標準偏差	0.71	0.92	0.82	1.18	0.91	1.53	0.98		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査