

表 4183 PET Cr D/P比 原疾患別 (PD・HD(F)等併用患者)

原疾患	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	36 (14.1)	118 (46.1)	77 (30.1)	25 (9.8)	256 (100.0)	471	727	0.62	0.15
慢性腎盂腎炎 (%)		4 (66.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	6 (100.0)	8	14	0.65	0.11
急速進行性糸球 体腎炎 (%)		1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	3 (100.0)	7	10	0.72	0.17
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)	2 (33.3)	2 (33.3)	2 (33.3)		6 (100.0)	4	10	0.58	0.10
その他の分類不能 の腎炎 (%)	3 (42.9)	3 (42.9)	1 (14.3)		7 (100.0)	12	19	0.48	0.13
多発性嚢胞腎 (%)	2 (13.3)	6 (40.0)	4 (26.7)	3 (20.0)	15 (100.0)	22	37	0.67	0.14
腎硬化症 (%)	5 (11.1)	13 (28.9)	18 (40.0)	9 (20.0)	45 (100.0)	98	143	0.67	0.15
悪性高血圧 (%)	1 (11.1)	4 (44.4)	1 (11.1)	3 (33.3)	9 (100.0)	13	22	0.70	0.16
糖尿病性腎症 (%)	14 (8.4)	61 (36.7)	66 (39.8)	25 (15.1)	166 (100.0)	364	530	0.66	0.13
SLE腎炎 (%)			1 (100.0)		1 (100.0)	7	8	0.70	
アミロイド腎 (%)						2	2		
痛風腎 (%)	1 (50.0)			1 (50.0)	2 (100.0)	5	7	0.65	0.30
先天性代謝異常に よる腎不全 (%)			1 (100.0)		1 (100.0)		1	0.68	
腎・尿路結核 (%)									
腎・尿路結石 (%)						2	2		
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (100.0)		1 (100.0)	2	3	0.73	
閉塞性尿路障害 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)	2	3	0.62	
骨髄腫 (%)						1	1		
腎形成不全 (%)	2 (100.0)				2 (100.0)	2	4	0.41	0.01
不明 (%)	4 (8.2)	21 (42.9)	21 (42.9)	3 (6.1)	49 (100.0)	101	150	0.64	0.14
再導入 (%)		1 (33.3)	2 (66.7)		3 (100.0)	12	15	0.63	0.05
その他 (%)	3 (27.3)	3 (27.3)	3 (27.3)	2 (18.2)	11 (100.0)	29	40	0.59	0.24
合計 (%)	73 (12.5)	238 (40.8)	200 (34.2)	73 (12.5)	584 (100.0)	1,164	1,748	0.64	0.15
記載なし (%)									
総計 (%)	73 (12.5)	238 (40.8)	200 (34.2)	73 (12.5)	584 (100.0)	1,164	1,748	0.64	0.15

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査