

表 4187 PET Cr D/P比 一日透析液使用量(L/日)別 (PD・HD(F)等併用患者)

一日透析液使用量	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満	3	3		1	7	6	13	0.57	0.14
(%)	(42.9)	(42.9)		(14.3)	(100.0)				
2～		3	3	2	8	14	22	0.70	0.11
(%)		(37.5)	(37.5)	(25.0)	(100.0)				
4～	5	20	21	7	53	33	86	0.64	0.15
(%)	(9.4)	(37.7)	(39.6)	(13.2)	(100.0)				
6～	24	83	63	23	193	109	302	0.63	0.15
(%)	(12.4)	(43.0)	(32.6)	(11.9)	(100.0)				
8～	26	73	71	26	196	169	365	0.64	0.14
(%)	(13.3)	(37.2)	(36.2)	(13.3)	(100.0)				
10～	9	30	25	8	72	63	135	0.63	0.14
(%)	(12.5)	(41.7)	(34.7)	(11.1)	(100.0)				
12～	3	18	12	5	38	33	71	0.64	0.16
(%)	(7.9)	(47.4)	(31.6)	(13.2)	(100.0)				
合計	70	230	195	72	567	427	994	0.64	0.14
(%)	(12.3)	(40.6)	(34.4)	(12.7)	(100.0)				
記載なし	3	8	5	1	17	737	754	0.58	0.19
(%)	(17.6)	(47.1)	(29.4)	(5.9)	(100.0)				
総計	73	238	200	73	584	1,164	1,748	0.64	0.15
(%)	(12.5)	(40.8)	(34.2)	(12.5)	(100.0)				
平均	7.60	7.82	7.84	7.85	7.80	8.02	7.90		
標準偏差	2.73	2.33	2.26	2.37	2.36	2.62	2.47		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査