

表 4194 PET Cr D/P比 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

| 2014年中の出口 部感染発症率(回 /1患者・年) | 0.5未満 | 0.5～ | 0.65～ | 0.81～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|------|------|
| 0 | 55 | 172 | 149 | 51 | 427 | 366 | 793 | 0.63 | 0.15 |
| (%) | (12.9) | (40.3) | (34.9) | (11.9) | (100.0) | | | | |
| 1.0～ | 9 | 32 | 32 | 15 | 88 | 37 | 125 | 0.66 | 0.14 |
| (%) | (10.2) | (36.4) | (36.4) | (17.0) | (100.0) | | | | |
| 2.0～ | 3 | 11 | 6 | 3 | 23 | 10 | 33 | 0.61 | 0.18 |
| (%) | (13.0) | (47.8) | (26.1) | (13.0) | (100.0) | | | | |
| 3.0～ | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 14 | 0.62 | 0.11 |
| (%) | (9.1) | (45.5) | (36.4) | (9.1) | (100.0) | | | | |
| 4.0～ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0.63 | 0.16 |
| (%) | (33.3) | (16.7) | (33.3) | (16.7) | (100.0) | | | | |
| 5.0～ | | 7 | 3 | 1 | 11 | 5 | 16 | 0.64 | 0.11 |
| (%) | | (63.6) | (27.3) | (9.1) | (100.0) | | | | |
| 合計 | 70 | 228 | 196 | 72 | 566 | 423 | 989 | 0.64 | 0.15 |
| (%) | (12.4) | (40.3) | (34.6) | (12.7) | (100.0) | | | | |
| 不明 記載なし | 3 | 10 | 4 | 1 | 18 | 741 | 759 | 0.61 | 0.12 |
| (%) | (16.7) | (55.6) | (22.2) | (5.6) | (100.0) | | | | |
| 総計 | 73 | 238 | 200 | 73 | 584 | 1,164 | 1,748 | 0.64 | 0.15 |
| (%) | (12.5) | (40.8) | (34.2) | (12.5) | (100.0) | | | | |
| 平均 | 0.37 | 0.51 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.25 | 0.37 | | |
| 標準偏差 | 0.87 | 1.27 | 1.05 | 0.93 | 1.11 | 0.86 | 1.02 | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査