

表 4195 PET Cr D/P比 残腎Kt/V別 (PD・HD(F)等併用患者)

残腎Kt/V	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.1未満	35	84	76	22	217	32	249	0.63	0.16
(%)	(16.1)	(38.7)	(35.0)	(10.1)	(100.0)				
0.1～	3	30	21	18	72	2	74	0.68	0.14
(%)	(4.2)	(41.7)	(29.2)	(25.0)	(100.0)				
0.4～		1	14	3	18	5	23	0.73	0.08
(%)		(5.6)	(77.8)	(16.7)	(100.0)				
0.8～	1	4	5	2	12	3	15	0.66	0.21
(%)	(8.3)	(33.3)	(41.7)	(16.7)	(100.0)				
1.2～		7	2	3	12	2	14	0.70	0.14
(%)		(58.3)	(16.7)	(25.0)	(100.0)				
1.7～		2		3	5	1	6	0.76	0.18
(%)		(40.0)		(60.0)	(100.0)				
2.0～	1		1		2		2	0.56	0.28
(%)	(50.0)		(50.0)		(100.0)				
2.4～	1		1	1	3		3	0.49	0.43
(%)	(33.3)		(33.3)	(33.3)	(100.0)				
合計	41	128	120	52	341	45	386	0.65	0.16
(%)	(12.0)	(37.5)	(35.2)	(15.2)	(100.0)				
記載なし	32	110	80	21	243	1,119	1,362	0.62	0.12
(%)	(13.2)	(45.3)	(32.9)	(8.6)	(100.0)				
総計	73	238	200	73	584	1,164	1,748	0.64	0.15
(%)	(12.5)	(40.8)	(34.2)	(12.5)	(100.0)				
平均	0.18	0.18	0.19	0.36	0.21	0.23	0.21		
標準偏差	0.66	0.41	0.42	0.61	0.48	0.45	0.48		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査