

表 4200 残腎Kt/V 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)													
PD単独 (%)	259 (14.6)	395 (22.3)	486 (27.5)	334 (18.9)	181 (10.2)	50 (2.8)	37 (2.1)	26 (1.5)	1,768 (100.0)	5,420	7,188	0.66	0.67
HD(F)単独.PDカテ あり (%)													
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	220 (62.1)	73 (20.6)	23 (6.5)	14 (4.0)	13 (3.7)	6 (1.7)	2 (0.6)	3 (0.8)	354 (100.0)	1,190	1,544	0.23	0.49
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	16 (88.9)			1 (5.6)	1 (5.6)				18 (100.0)	123	141	0.13	0.39
PD.HD併用週3 HD(F) (%)													
PD.HD併用週4 HD(F) (%)													
PD.HD併用その他 (%)	13 (92.9)	1 (7.1)							14 (100.0)	49	63	0.01	0.05
合計 (%)	508 (23.6)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.1)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,154 (100.0)	6,782	8,936	0.58	0.66
不明 (%)	2 (100.0)								2 (100.0)	3	5		
記載なし (%)													
総計 (%)	510 (23.7)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.0)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,156 (100.0)	6,785	8,941	0.58	0.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査