

表 4212 残腎Kt/V 大腿骨頸部骨折の既往別（腹膜透析患者）

大腿骨頸部骨折 の既往	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	438	421	459	312	174	47	33	26	1,910	3,821	5,731	0.58	0.66
(%)	(98.4)	(97.7)	(98.7)	(97.8)	(98.3)	(97.9)	(97.1)	(96.3)	(98.2)	(97.5)	(97.7)		
既往あり	7	10	6	7	3	1	1	1	36	98	134	0.70	0.94
(%)	(1.6)	(2.3)	(1.3)	(2.2)	(1.7)	(2.1)	(2.9)	(3.7)	(1.8)	(2.5)	(2.3)		
合計	445	431	465	319	177	48	34	27	1,946	3,919	5,865	0.58	0.66
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明	1	2	1						4	51	55	0.15	0.17
記載なし	64	36	43	30	18	8	5	2	206	2,815	3,021	0.55	0.65
総計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,785	8,941	0.58	0.66

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査