

表 4220 残腎Kt/V クレアチニン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

クレアチニン 濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)					1 (50.0)			1 (50.0)	2 (100.0)	15	17	3.30	2.40
2～ (%)	3 (8.8)	3 (8.8)	6 (17.6)	6 (17.6)	7 (20.6)	2 (5.9)	2 (5.9)	5 (14.7)	34 (100.0)	120	154	1.30	1.10
4～ (%)	10 (6.8)	15 (10.3)	29 (19.9)	33 (22.6)	35 (24.0)	8 (5.5)	10 (6.8)	6 (4.1)	146 (100.0)	429	575	1.05	0.79
6～ (%)	26 (7.2)	53 (14.7)	107 (29.6)	89 (24.7)	56 (15.5)	13 (3.6)	8 (2.2)	9 (2.5)	361 (100.0)	772	1,133	0.84	0.74
8～ (%)	72 (15.8)	109 (23.9)	115 (25.2)	103 (22.5)	35 (7.7)	9 (2.0)	11 (2.4)	3 (0.7)	457 (100.0)	892	1,349	0.62	0.59
10～ (%)	114 (28.6)	117 (29.4)	93 (23.4)	39 (9.8)	26 (6.5)	7 (1.8)	1 (0.3)	1 (0.3)	398 (100.0)	717	1,115	0.41	0.53
12～ (%)	99 (33.4)	82 (27.7)	61 (20.6)	35 (11.8)	11 (3.7)	7 (2.4)		1 (0.3)	296 (100.0)	552	848	0.38	0.46
14～ (%)	94 (49.7)	46 (24.3)	34 (18.0)	11 (5.8)	4 (2.1)				189 (100.0)	299	488	0.22	0.32
16～ (%)	57 (65.5)	16 (18.4)	9 (10.3)	3 (3.4)		1 (1.1)	1 (1.1)		87 (100.0)	208	295	0.17	0.36
合計 (%)	475 (24.1)	441 (22.4)	454 (23.0)	319 (16.2)	175 (8.9)	47 (2.4)	33 (1.7)	26 (1.3)	1,970 (100.0)	4,004	5,974	0.57	0.66
記載なし (%)	35 (18.8)	28 (15.1)	55 (29.6)	30 (16.1)	20 (10.8)	9 (4.8)	6 (3.2)	3 (1.6)	186 (100.0)	2,781	2,967	0.69	0.69
総計 (%)	510 (23.7)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.0)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,156 (100.0)	6,785	8,941	0.58	0.66
平均	12.33	10.77	9.68	8.82	7.91	8.67	7.14	6.17	10.15	9.75	9.89		
標準偏差	3.28	2.97	2.93	2.83	2.70	3.17	2.77	2.60	3.37	3.60	3.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査