

表 4221 残腎Kt/V アルブミン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

アルブミン 濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	1 (100.0)								1 (100.0)	14	15		
1.5～ (%)	4 (20.0)	10 (50.0)	3 (15.0)	2 (10.0)			1 (5.0)		20 (100.0)	51	71	0.40	0.51
2.0～ (%)	18 (25.7)	18 (25.7)	19 (27.1)	9 (12.9)	6 (8.6)				70 (100.0)	228	298	0.44	0.43
2.5～ (%)	83 (27.6)	64 (21.3)	83 (27.6)	35 (11.6)	21 (7.0)	10 (3.3)	2 (0.7)	3 (1.0)	301 (100.0)	736	1,037	0.50	0.62
3.0～ (%)	173 (23.7)	202 (27.7)	166 (22.7)	108 (14.8)	55 (7.5)	10 (1.4)	7 (1.0)	9 (1.2)	730 (100.0)	1,428	2,158	0.51	0.62
3.5～ (%)	148 (22.0)	123 (18.3)	151 (22.4)	131 (19.5)	75 (11.1)	16 (2.4)	19 (2.8)	10 (1.5)	673 (100.0)	1,233	1,906	0.65	0.71
4.0～ (%)	40 (25.2)	22 (13.8)	33 (20.8)	30 (18.9)	17 (10.7)	10 (6.3)	4 (2.5)	3 (1.9)	159 (100.0)	272	431	0.68	0.68
4.5～ (%)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)			9 (100.0)	12	21	0.82	0.64
5.0～ (%)								1 (100.0)	1 (100.0)	1	2	2.90	
合計 (%)	469 (23.9)	440 (22.4)	456 (23.2)	318 (16.2)	175 (8.9)	47 (2.4)	33 (1.7)	26 (1.3)	1,964 (100.0)	3,975	5,939	0.57	0.66
記載なし (%)	41 (21.4)	29 (15.1)	53 (27.6)	31 (16.1)	20 (10.4)	9 (4.7)	6 (3.1)	3 (1.6)	192 (100.0)	2,810	3,002	0.67	0.69
総計 (%)	510 (23.7)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.0)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,156 (100.0)	6,785	8,941	0.58	0.66
平均	3.31	3.25	3.31	3.42	3.42	3.49	3.49	3.52	3.33	3.25	3.28		
標準偏差	0.51	0.49	0.49	0.48	0.47	0.54	0.49	0.52	0.50	0.53	0.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査