

表 4223 残腎Kt/V 補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

補正 カルシウム濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		3 (50.0)	2 (33.3)		1 (16.7)				6 (100.0)	23	29	0.45	0.43
7.0～ (%)	3 (37.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)		1 (12.5)			8 (100.0)	28	36	0.60	0.68
7.5～ (%)	2 (7.7)	5 (19.2)	4 (15.4)	10 (38.5)	4 (15.4)	1 (3.8)			26 (100.0)	101	127	0.75	0.51
8.0～ (%)	22 (26.8)	20 (24.4)	16 (19.5)	9 (11.0)	8 (9.8)	4 (4.9)	2 (2.4)	1 (1.2)	82 (100.0)	204	286	0.57	0.64
8.4～ (%)	5 (23.8)	7 (33.3)	4 (19.0)	1 (4.8)	3 (14.3)			1 (4.8)	21 (100.0)	65	86	0.52	0.65
8.5～ (%)	76 (23.8)	55 (17.2)	73 (22.9)	63 (19.7)	36 (11.3)	7 (2.2)	5 (1.6)	4 (1.3)	319 (100.0)	587	906	0.62	0.67
9.0～ (%)	131 (22.5)	124 (21.3)	132 (22.7)	93 (16.0)	66 (11.3)	19 (3.3)	7 (1.2)	10 (1.7)	582 (100.0)	1,020	1,602	0.63	0.72
9.5～ (%)	124 (21.9)	134 (23.6)	144 (25.4)	102 (18.0)	36 (6.3)	9 (1.6)	13 (2.3)	5 (0.9)	567 (100.0)	1,062	1,629	0.54	0.58
10.0～ (%)	19 (30.6)	18 (29.0)	12 (19.4)	6 (9.7)	3 (4.8)	1 (1.6)	1 (1.6)	2 (3.2)	62 (100.0)	129	191	0.46	0.62
10.1～ (%)	52 (29.7)	44 (25.1)	36 (20.6)	25 (14.3)	11 (6.3)	4 (2.3)	2 (1.1)	1 (0.6)	175 (100.0)	382	557	0.46	0.53
10.5～ (%)	20 (27.4)	22 (30.1)	16 (21.9)	6 (8.2)	5 (6.8)		2 (2.7)	2 (2.7)	73 (100.0)	223	296	0.55	1.01
11.0～ (%)	7 (28.0)	4 (16.0)	11 (44.0)		2 (8.0)	1 (4.0)			25 (100.0)	86	111	0.44	0.48
11.5～ (%)	4 (44.4)	1 (11.1)	3 (33.3)				1 (11.1)		9 (100.0)	20	29	0.43	0.65
12.0～ (%)	2 (40.0)	2 (40.0)		1 (20.0)					5 (100.0)	22	27	0.24	0.38
合計 (%)	467 (23.8)	440 (22.4)	454 (23.2)	318 (16.2)	175 (8.9)	47 (2.4)	33 (1.7)	26 (1.3)	1,960 (100.0)	3,952	5,912	0.57	0.66
記載なし (%)	43 (21.9)	29 (14.8)	55 (28.1)	31 (15.8)	20 (10.2)	9 (4.6)	6 (3.1)	3 (1.5)	196 (100.0)	2,833	3,029	0.66	0.69
総計 (%)	510 (23.7)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.0)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,156 (100.0)	6,785	8,941	0.58	0.66
平均	9.47	9.43	9.42	9.30	9.23	9.20	9.55	9.37	9.40	9.41	9.41		
標準偏差	0.72	0.77	0.70	0.64	0.70	0.73	0.71	0.59	0.71	0.83	0.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査