

表 4227 残腎Kt/V ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

ヘモグロビン 濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)										7	7		
5～ (%)	1 (50.0)		1 (50.0)						2 (100.0)	12	14	0.35	0.49
6～ (%)		4 (80.0)		1 (20.0)					5 (100.0)	23	28	0.38	0.36
7～ (%)	10 (41.7)	5 (20.8)	3 (12.5)	3 (12.5)	3 (12.5)				24 (100.0)	100	124	0.40	0.49
8～ (%)	28 (30.1)	25 (26.9)	16 (17.2)	16 (17.2)	5 (5.4)	1 (1.1)	2 (2.2)		93 (100.0)	251	344	0.43	0.49
9～ (%)	70 (25.3)	65 (23.5)	72 (26.0)	37 (13.4)	19 (6.9)	9 (3.2)	3 (1.1)	2 (0.7)	277 (100.0)	626	903	0.51	0.54
10～ (%)	137 (23.1)	146 (24.6)	159 (26.8)	83 (14.0)	48 (8.1)	7 (1.2)	7 (1.2)	6 (1.0)	593 (100.0)	1,113	1,706	0.53	0.66
11～ (%)	145 (23.0)	132 (20.9)	141 (22.3)	116 (18.4)	57 (9.0)	17 (2.7)	13 (2.1)	10 (1.6)	631 (100.0)	1,078	1,709	0.60	0.67
12～ (%)	57 (23.0)	48 (19.4)	47 (19.0)	47 (19.0)	29 (11.7)	11 (4.4)	3 (1.2)	6 (2.4)	248 (100.0)	548	796	0.67	0.72
13～ (%)	18 (26.1)	9 (13.0)	16 (23.2)	11 (15.9)	9 (13.0)	2 (2.9)	3 (4.3)	1 (1.4)	69 (100.0)	168	237	0.69	0.67
14～ (%)	5 (26.3)	6 (31.6)	1 (5.3)	3 (15.8)	2 (10.5)		1 (5.3)	1 (5.3)	19 (100.0)	60	79	0.75	1.13
合計 (%)	471 (24.0)	440 (22.4)	456 (23.3)	317 (16.2)	172 (8.8)	47 (2.4)	32 (1.6)	26 (1.3)	1,961 (100.0)	3,986	5,947	0.57	0.66
記載なし (%)	39 (20.0)	29 (14.9)	53 (27.2)	32 (16.4)	23 (11.8)	9 (4.6)	7 (3.6)	3 (1.5)	195 (100.0)	2,799	2,994	0.69	0.69
総計 (%)	510 (23.7)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.0)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,156 (100.0)	6,785	8,941	0.58	0.66
平均	10.82	10.77	10.79	11.04	11.08	11.17	11.28	11.56	10.88	10.77	10.81		
標準偏差	1.31	1.27	1.13	1.30	1.27	1.06	1.33	1.11	1.26	1.49	1.42		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査