

表 4228 残腎Kt/V 総コレステロール濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

総コレステロール濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	8 (50.0)	4 (25.0)	3 (18.8)		1 (6.3)				16 (100.0)	34	50	0.24	0.38
100～ (%)	21 (36.2)	13 (22.4)	15 (25.9)	4 (6.9)	5 (8.6)				58 (100.0)	102	160	0.35	0.42
120～ (%)	53 (33.1)	45 (28.1)	28 (17.5)	15 (9.4)	14 (8.8)	3 (1.9)	1 (0.6)	1 (0.6)	160 (100.0)	288	448	0.44	0.65
140～ (%)	81 (29.0)	53 (19.0)	53 (19.0)	55 (19.7)	22 (7.9)	6 (2.2)	5 (1.8)	4 (1.4)	279 (100.0)	527	806	0.58	0.77
160～ (%)	94 (29.9)	72 (22.9)	72 (22.9)	49 (15.6)	19 (6.1)	3 (1.0)	2 (0.6)	3 (1.0)	314 (100.0)	551	865	0.48	0.63
180～ (%)	69 (21.3)	69 (21.3)	86 (26.5)	53 (16.4)	31 (9.6)	6 (1.9)	5 (1.5)	5 (1.5)	324 (100.0)	509	833	0.58	0.60
200～ (%)	43 (21.1)	53 (26.0)	51 (25.0)	30 (14.7)	17 (8.3)	6 (2.9)	2 (1.0)	2 (1.0)	204 (100.0)	360	564	0.54	0.56
220～ (%)	27 (25.2)	25 (23.4)	24 (22.4)	17 (15.9)	8 (7.5)	3 (2.8)	2 (1.9)	1 (0.9)	107 (100.0)	211	318	0.53	0.68
240～ (%)	12 (26.7)	9 (20.0)	11 (24.4)	4 (8.9)	4 (8.9)	1 (2.2)	2 (4.4)	2 (4.4)	45 (100.0)	114	159	0.66	0.83
260～ (%)	9 (16.7)	10 (18.5)	18 (33.3)	8 (14.8)	3 (5.6)	1 (1.9)	3 (5.6)	2 (3.7)	54 (100.0)	95	149	0.68	0.71
合計 (%)	417 (26.7)	353 (22.6)	361 (23.1)	235 (15.1)	124 (7.9)	29 (1.9)	22 (1.4)	20 (1.3)	1,561 (100.0)	2,791	4,352	0.53	0.65
記載なし (%)	93 (15.6)	116 (19.5)	148 (24.9)	114 (19.2)	71 (11.9)	27 (4.5)	17 (2.9)	9 (1.5)	595 (100.0)	3,994	4,589	0.71	0.66
総計 (%)	510 (23.7)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.0)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,156 (100.0)	6,785	8,941	0.58	0.66
平均	172.34	177.89	184.34	180.29	178.87	186.86	197.36	196.10	179.01	179.01	179.01		
標準偏差	39.48	40.29	43.75	33.75	41.18	37.95	44.13	46.04	40.43	40.60	40.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査