

表 4229 残腎Kt/V HDL-C濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

HDL-C濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (50.0)	1 (50.0)							2 (100.0)	6	8	0.15	0.21
20～ (%)	48 (45.7)	18 (17.1)	18 (17.1)	13 (12.4)	4 (3.8)	2 (1.9)	1 (1.0)	1 (1.0)	105 (100.0)	183	288	0.39	0.57
30～ (%)	103 (30.5)	58 (17.2)	61 (18.0)	64 (18.9)	34 (10.1)	9 (2.7)	4 (1.2)	5 (1.5)	338 (100.0)	595	933	0.58	0.69
40～ (%)	79 (21.5)	79 (21.5)	103 (28.0)	62 (16.8)	26 (7.1)	10 (2.7)	4 (1.1)	5 (1.4)	368 (100.0)	622	990	0.58	0.72
50～ (%)	81 (25.6)	73 (23.0)	75 (23.7)	42 (13.2)	28 (8.8)	6 (1.9)	7 (2.2)	5 (1.6)	317 (100.0)	522	839	0.57	0.70
60～ (%)	53 (24.5)	46 (21.3)	53 (24.5)	30 (13.9)	23 (10.6)	6 (2.8)	1 (0.5)	4 (1.9)	216 (100.0)	300	516	0.58	0.66
70～ (%)	22 (21.8)	22 (21.8)	29 (28.7)	18 (17.8)	5 (5.0)	3 (3.0)	2 (2.0)		101 (100.0)	158	259	0.52	0.49
80～ (%)	12 (21.4)	12 (21.4)	16 (28.6)	10 (17.9)	6 (10.7)				56 (100.0)	85	141	0.50	0.46
90～ (%)	4 (16.0)	7 (28.0)	4 (16.0)	5 (20.0)	2 (8.0)		2 (8.0)	1 (4.0)	25 (100.0)	36	61	0.76	0.78
100～ (%)	2 (10.5)	10 (52.6)	2 (10.5)	3 (15.8)			1 (5.3)	1 (5.3)	19 (100.0)	38	57	0.54	0.76
合計 (%)	405 (26.2)	326 (21.1)	361 (23.3)	247 (16.0)	128 (8.3)	36 (2.3)	22 (1.4)	22 (1.4)	1,547 (100.0)	2,545	4,092	0.56	0.67
記載なし (%)	105 (17.2)	143 (23.5)	148 (24.3)	102 (16.7)	67 (11.0)	20 (3.3)	17 (2.8)	7 (1.1)	609 (100.0)	4,240	4,849	0.63	0.62
総計 (%)	510 (23.7)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.0)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,156 (100.0)	6,785	8,941	0.58	0.66
平均	48.10	53.14	51.93	50.79	50.88	48.75	58.41	55.18	50.98	50.17	50.47		
標準偏差	17.47	19.28	16.43	17.96	15.56	13.98	29.57	23.69	17.90	17.61	17.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査