

表 4231 残腎Kt/V 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)										1	1		
60～ (%)	1 (20.0)		3 (60.0)	1 (20.0)					5 (100.0)	8	13	0.50	0.36
80～ (%)	18 (43.9)	8 (19.5)	8 (19.5)	3 (7.3)	3 (7.3)	1 (2.4)			41 (100.0)	83	124	0.34	0.47
100～ (%)	61 (26.5)	42 (18.3)	54 (23.5)	36 (15.7)	26 (11.3)	1 (0.4)	7 (3.0)	3 (1.3)	230 (100.0)	411	641	0.59	0.66
120～ (%)	103 (18.7)	134 (24.3)	127 (23.0)	111 (20.1)	45 (8.2)	16 (2.9)	11 (2.0)	4 (0.7)	551 (100.0)	965	1,516	0.60	0.66
140～ (%)	140 (24.4)	110 (19.2)	148 (25.8)	96 (16.7)	54 (9.4)	13 (2.3)	7 (1.2)	6 (1.0)	574 (100.0)	1,005	1,579	0.56	0.57
160～ (%)	77 (28.0)	65 (23.6)	59 (21.5)	32 (11.6)	26 (9.5)	7 (2.5)	1 (0.4)	8 (2.9)	275 (100.0)	446	721	0.58	0.83
180～ (%)	25 (35.2)	21 (29.6)	12 (16.9)	8 (11.3)	2 (2.8)	1 (1.4)		2 (2.8)	71 (100.0)	146	217	0.41	0.57
200～ (%)	1 (11.1)	3 (33.3)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)			9 (100.0)	22	31	0.63	0.59
220～ (%)	2 (40.0)		1 (20.0)		2 (40.0)				5 (100.0)	5	10	0.62	0.66
合計 (%)	428 (24.3)	383 (21.7)	414 (23.5)	288 (16.4)	159 (9.0)	40 (2.3)	26 (1.5)	23 (1.3)	1,761 (100.0)	3,092	4,853	0.57	0.66
記載なし (%)	82 (20.8)	86 (21.8)	95 (24.1)	61 (15.4)	36 (9.1)	16 (4.1)	13 (3.3)	6 (1.5)	395 (100.0)	3,693	4,088	0.63	0.68
総計 (%)	510 (23.7)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.0)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,156 (100.0)	6,785	8,941	0.58	0.66
平均	141.98	142.32	139.88	138.65	140.75	142.50	131.50	150.65	140.87	141.09	141.01		
標準偏差	25.17	22.69	21.65	19.80	21.97	22.03	16.80	21.98	22.54	23.08	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査