

表 4235 残腎Kt/V 使用透析液の種類別（腹膜透析患者）

使用透析液の種類	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5%液のみ	65	135	242	202	116	30	22	14	826	1,449	2,275	0.80	0.66
(%)	(7.9)	(16.3)	(29.3)	(24.5)	(14.0)	(3.6)	(2.7)	(1.7)	(100.0)				
1.5%液と2.5%液の併用	106	74	46	23	14	6	3	3	275	512	787	0.39	0.64
(%)	(38.5)	(26.9)	(16.7)	(8.4)	(5.1)	(2.2)	(1.1)	(1.1)	(100.0)				
2.5%液のみ	14	10	15	8	1			1	49	128	177	0.47	0.56
(%)	(28.6)	(20.4)	(30.6)	(16.3)	(2.0)			(2.0)	(100.0)				
4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	3								3	5	8		
(%)	(100.0)								(100.0)				
イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）			4	3	4	3	1	1	16	41	57	1.43	1.02
(%)			(25.0)	(18.8)	(25.0)	(18.8)	(6.3)	(6.3)	(100.0)				
1.5%+イコデキストリン	95	141	126	69	40	11	10	8	500	722	1,222	0.57	0.65
(%)	(19.0)	(28.2)	(25.2)	(13.8)	(8.0)	(2.2)	(2.0)	(1.6)	(100.0)				
1.5%+2.5%+イコデキストリン	134	64	38	17	6	2	2	2	265	294	559	0.27	0.53
(%)	(50.6)	(24.2)	(14.3)	(6.4)	(2.3)	(0.8)	(0.8)	(0.8)	(100.0)				
2.5%+イコデキストリン	86	34	24	16	4				164	277	441	0.23	0.35
(%)	(52.4)	(20.7)	(14.6)	(9.8)	(2.4)				(100.0)				
4.25%液+イコデキストリン				1					1	5	6	0.90	
(%)				(100.0)					(100.0)				
合計	503	458	495	339	185	52	38	29	2,099	3,433	5,532	0.58	0.66
(%)	(24.0)	(21.8)	(23.6)	(16.2)	(8.8)	(2.5)	(1.8)	(1.4)	(100.0)				
不明	4	11	12	8	8	4	1		48	17	65	0.74	0.56
(%)	(8.3)	(22.9)	(25.0)	(16.7)	(16.7)	(8.3)	(2.1)		(100.0)				
記載なし	3		2	2	2				9	3,335	3,344	0.61	0.56
(%)	(33.3)		(22.2)	(22.2)	(22.2)				(100.0)				
総計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,785	8,941	0.58	0.66
(%)	(23.7)	(21.8)	(23.6)	(16.2)	(9.0)	(2.6)	(1.8)	(1.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査