

表 4236 残腎Kt/V 一日透析液使用量(L/日)別(腹膜透析患者)

一日透析液使用量	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満	6	3	8	10	4	4		5	40	79	119	1.10	1.09
(%)	(15.0)	(7.5)	(20.0)	(25.0)	(10.0)	(10.0)		(12.5)	(100.0)				
2～	7	7	31	34	39	3	6	4	131	262	393	1.03	0.60
(%)	(5.3)	(5.3)	(23.7)	(26.0)	(29.8)	(2.3)	(4.6)	(3.1)	(100.0)				
4～	30	71	105	110	64	11	14	4	409	663	1,072	0.80	0.61
(%)	(7.3)	(17.4)	(25.7)	(26.9)	(15.6)	(2.7)	(3.4)	(1.0)	(100.0)				
6～	152	182	187	119	48	26	11	11	736	1,059	1,795	0.57	0.65
(%)	(20.7)	(24.7)	(25.4)	(16.2)	(6.5)	(3.5)	(1.5)	(1.5)	(100.0)				
8～	190	124	117	50	25	4	3	3	516	890	1,406	0.39	0.60
(%)	(36.8)	(24.0)	(22.7)	(9.7)	(4.8)	(0.8)	(0.6)	(0.6)	(100.0)				
10～	72	49	34	13	4	3	3	1	179	231	410	0.34	0.57
(%)	(40.2)	(27.4)	(19.0)	(7.3)	(2.2)	(1.7)	(1.7)	(0.6)	(100.0)				
12～	44	22	11	5	3	1	1	1	88	113	201	0.30	0.56
(%)	(50.0)	(25.0)	(12.5)	(5.7)	(3.4)	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(100.0)				
合計	501	458	493	341	187	52	38	29	2,099	3,297	5,396	0.58	0.66
(%)	(23.9)	(21.8)	(23.5)	(16.2)	(8.9)	(2.5)	(1.8)	(1.4)	(100.0)				
記載なし	9	11	16	8	8	4	1		57	3,488	3,545	0.66	0.55
(%)	(15.8)	(19.3)	(28.1)	(14.0)	(14.0)	(7.0)	(1.8)		(100.0)				
総計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,785	8,941	0.58	0.66
(%)	(23.7)	(21.8)	(23.6)	(16.2)	(9.0)	(2.6)	(1.8)	(1.3)	(100.0)				
平均	8.23	7.37	6.70	5.92	5.42	5.94	5.79	5.60	6.92	6.70	6.78		
標準偏差	2.58	2.24	2.64	2.46	2.38	2.37	2.28	3.68	2.67	2.74	2.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査