

表 4239 残腎Kt/V APD使用の有無別（腹膜透析患者）

APD使用の有無	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	254	228	265	179	93	24	21	18	1,082	1,874	2,956	0.58	0.64
(%)	(51.0)	(50.1)	(53.8)	(53.4)	(50.0)	(47.1)	(55.3)	(62.1)	(51.9)	(55.4)	(54.1)		
あり	244	227	228	156	93	27	17	11	1,003	1,507	2,510	0.57	0.69
(%)	(49.0)	(49.9)	(46.2)	(46.6)	(50.0)	(52.9)	(44.7)	(37.9)	(48.1)	(44.6)	(45.9)		
合計	498	455	493	335	186	51	38	29	2,085	3,381	5,466	0.58	0.66
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			1	2					3	32	35	0.87	0.21
記載なし	12	14	15	12	9	5	1		68	3,372	3,440	0.66	0.56
総計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,785	8,941	0.58	0.66

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査