

表 4247 残腎Kt/V 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	0.1未満	0.1~	0.4~	0.8~	1.2~	1.7~	2.0~	2.4~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD)	137	216	266	177	85	24	21	15	941	3,191	4,132	0.65	0.63
(%)	(14.6)	(23.0)	(28.3)	(18.8)	(9.0)	(2.6)	(2.2)	(1.6)	(100.0)				
腹膜透析 (APD)	65	114	147	118	83	21	13	10	571	1,765	2,336	0.76	0.76
(%)	(11.4)	(20.0)	(25.7)	(20.7)	(14.5)	(3.7)	(2.3)	(1.8)	(100.0)				
腹膜透析 (CCPD)	57	65	73	39	13	5	3	1	256	464	720	0.49	0.52
(%)	(22.3)	(25.4)	(28.5)	(15.2)	(5.1)	(2.0)	(1.2)	(0.4)	(100.0)				
合計	259	395	486	334	181	50	37	26	1,768	5,420	7,188	0.66	0.67
(%)	(14.6)	(22.3)	(27.5)	(18.9)	(10.2)	(2.8)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				
記載なし (%)													
総計	259	395	486	334	181	50	37	26	1,768	5,420	7,188	0.66	0.67
(%)	(14.6)	(22.3)	(27.5)	(18.9)	(10.2)	(2.8)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査