

表 4255 残腎Kt/V 使用透析液の種類別（腹膜透析単独患者）

使用透析液の種類	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5%液のみ	42	122	235	199	114	28	21	13	774	1,317	2,091	0.83	0.66
(%)	(5.4)	(15.8)	(30.4)	(25.7)	(14.7)	(3.6)	(2.7)	(1.7)	(100.0)				
1.5%液と2.5%液の併用	54	67	45	20	13	4	2	3	208	357	565	0.46	0.68
(%)	(26.0)	(32.2)	(21.6)	(9.6)	(6.3)	(1.9)	(1.0)	(1.4)	(100.0)				
2.5%液のみ	6	8	14	7	1				36	90	126	0.49	0.34
(%)	(16.7)	(22.2)	(38.9)	(19.4)	(2.8)				(100.0)				
4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	2								2	5	7		
(%)	(100.0)								(100.0)				
イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）			4	3	4	3	1	1	16	35	51	1.43	1.02
(%)			(25.0)	(18.8)	(25.0)	(18.8)	(6.3)	(6.3)	(100.0)				
1.5%+イコデキストリン	42	115	117	66	34	9	10	7	400	605	1,005	0.64	0.66
(%)	(10.5)	(28.8)	(29.3)	(16.5)	(8.5)	(2.3)	(2.5)	(1.8)	(100.0)				
1.5%+2.5%+イコデキストリン	70	54	37	13	3	2	2	2	183	183	366	0.34	0.59
(%)	(38.3)	(29.5)	(20.2)	(7.1)	(1.6)	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(100.0)				
2.5%+イコデキストリン	41	26	22	15	3				107	187	294	0.31	0.37
(%)	(38.3)	(24.3)	(20.6)	(14.0)	(2.8)				(100.0)				
4.25%液+イコデキストリン				1					1	2	3	0.90	
(%)				(100.0)					(100.0)				
合計	257	392	474	324	172	46	36	26	1,727	2,781	4,508	0.65	0.67
(%)	(14.9)	(22.7)	(27.4)	(18.8)	(10.0)	(2.7)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				
不明	1	3	10	8	7	4	1		34	14	48	0.94	0.51
(%)	(2.9)	(8.8)	(29.4)	(23.5)	(20.6)	(11.8)	(2.9)		(100.0)				
記載なし	1		2	2	2				7	2,625	2,632	0.79	0.51
(%)	(14.3)		(28.6)	(28.6)	(28.6)				(100.0)				
総計	259	395	486	334	181	50	37	26	1,768	5,420	7,188	0.66	0.67
(%)	(14.6)	(22.3)	(27.5)	(18.9)	(10.2)	(2.8)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査