

表 4256 残腎Kt/V 一日透析液使用量(L/日)別(腹膜透析単独患者)

一日透析液使用量	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満	3	3	8	9	4	4		5	36	70	106	1.19	1.10
(%)	(8.3)	(8.3)	(22.2)	(25.0)	(11.1)	(11.1)		(13.9)	(100.0)				
2～	7	7	30	34	38	3	6	4	129	242	371	1.03	0.61
(%)	(5.4)	(5.4)	(23.3)	(26.4)	(29.5)	(2.3)	(4.7)	(3.1)	(100.0)				
4～	23	64	103	109	63	11	14	3	390	596	986	0.82	0.60
(%)	(5.9)	(16.4)	(26.4)	(27.9)	(16.2)	(2.8)	(3.6)	(0.8)	(100.0)				
6～	73	159	180	116	43	22	11	10	614	879	1,493	0.64	0.66
(%)	(11.9)	(25.9)	(29.3)	(18.9)	(7.0)	(3.6)	(1.8)	(1.6)	(100.0)				
8～	91	104	109	44	22	3	2	3	378	663	1,041	0.47	0.64
(%)	(24.1)	(27.5)	(28.8)	(11.6)	(5.8)	(0.8)	(0.5)	(0.8)	(100.0)				
10～	35	40	31	10	3	3	2	1	125	148	273	0.41	0.62
(%)	(28.0)	(32.0)	(24.8)	(8.0)	(2.4)	(2.4)	(1.6)	(0.8)	(100.0)				
12～	25	15	11	4	1		1		57	72	129	0.28	0.42
(%)	(43.9)	(26.3)	(19.3)	(7.0)	(1.8)		(1.8)		(100.0)				
合計	257	392	472	326	174	46	36	26	1,729	2,670	4,399	0.66	0.67
(%)	(14.9)	(22.7)	(27.3)	(18.9)	(10.1)	(2.7)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				
記載なし	2	3	14	8	7	4	1		39	2,750	2,789	0.87	0.51
(%)	(5.1)	(7.7)	(35.9)	(20.5)	(17.9)	(10.3)	(2.6)		(100.0)				
総計	259	395	486	334	181	50	37	26	1,768	5,420	7,188	0.66	0.67
(%)	(14.6)	(22.3)	(27.5)	(18.9)	(10.2)	(2.8)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				
平均	8.19	7.22	6.66	5.83	5.21	5.63	5.61	5.01	6.64	6.46	6.53		
標準偏差	2.94	2.21	2.66	2.42	2.06	2.14	2.18	2.52	2.65	2.73	2.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査