

表 4261 残腎Kt/V PD透析液交換方法別（腹膜透析単独患者）

PD透析液交換方法	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
完全手動式	113	145	174	104	52	11	6	7	612	810	1,422	0.56	0.57
(%)	(18.5)	(23.7)	(28.4)	(17.0)	(8.5)	(1.8)	(1.0)	(1.1)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(紫外線)	127	191	226	163	83	26	23	16	855	1,467	2,322	0.69	0.74
(%)	(14.9)	(22.3)	(26.4)	(19.1)	(9.7)	(3.0)	(2.7)	(1.9)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	15	49	67	52	35	8	6	3	235	372	607	0.77	0.64
(%)	(6.4)	(20.9)	(28.5)	(22.1)	(14.9)	(3.4)	(2.6)	(1.3)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	1	3	9	4	1		1		19	47	66	0.69	0.47
(%)	(5.3)	(15.8)	(47.4)	(21.1)	(5.3)		(5.3)		(100.0)				
合計	256	388	476	323	171	45	36	26	1,721	2,696	4,417	0.65	0.67
(%)	(14.9)	(22.5)	(27.7)	(18.8)	(9.9)	(2.6)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				
不明	2	4	10	7	8	4	1		36	40	76	0.91	0.54
(%)	(5.6)	(11.1)	(27.8)	(19.4)	(22.2)	(11.1)	(2.8)		(100.0)				
記載なし	1	3		4	2	1			11	2,684	2,695	0.81	0.59
(%)	(9.1)	(27.3)		(36.4)	(18.2)	(9.1)			(100.0)				
総計	259	395	486	334	181	50	37	26	1,768	5,420	7,188	0.66	0.67
(%)	(14.6)	(22.3)	(27.5)	(18.9)	(10.2)	(2.8)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査