

表 4268 残腎Kt/V 治療方法(新分類)別 (PD・HD(F)等併用患者)

治療方法 (新分類)	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	128 (71.1)	19 (10.6)	7 (3.9)	9 (5.0)	10 (5.6)	3 (1.7)	1 (0.6)	3 (1.7)	180 (100.0)	709	889	0.25	0.58
腹膜透析 (APD) (%)	55 (52.4)	34 (32.4)	11 (10.5)	2 (1.9)	2 (1.9)	1 (1.0)			105 (100.0)	396	501	0.17	0.31
腹膜透析 (CCPD) (%)	66 (65.3)	21 (20.8)	5 (5.0)	4 (4.0)	2 (2.0)	2 (2.0)	1 (1.0)		101 (100.0)	257	358	0.18	0.42
合計 (%)	249 (64.5)	74 (19.2)	23 (6.0)	15 (3.9)	14 (3.6)	6 (1.6)	2 (0.5)	3 (0.8)	386 (100.0)	1,362	1,748	0.21	0.48
記載なし (%)													
総計 (%)	249 (64.5)	74 (19.2)	23 (6.0)	15 (3.9)	14 (3.6)	6 (1.6)	2 (0.5)	3 (0.8)	386 (100.0)	1,362	1,748	0.21	0.48

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査