

表 4269 残腎Kt/V 併用の状況別 (PD・HD(F)等併用患者)

併用の状況	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)													
PD単独 (%)													
HD(F)単独.PDカテ あり (%)													
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	220 (62.1)	73 (20.6)	23 (6.5)	14 (4.0)	13 (3.7)	6 (1.7)	2 (0.6)	3 (0.8)	354 (100.0)	1,190	1,544	0.23	0.49
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	16 (88.9)			1 (5.6)	1 (5.6)				18 (100.0)	123	141	0.13	0.39
PD.HD併用週3 HD(F) (%)													
PD.HD併用週4 HD(F) (%)													
PD.HD併用その他 (%)	13 (92.9)	1 (7.1)							14 (100.0)	49	63	0.01	0.05
合計 (%)	249 (64.5)	74 (19.2)	23 (6.0)	15 (3.9)	14 (3.6)	6 (1.6)	2 (0.5)	3 (0.8)	386 (100.0)	1,362	1,748	0.21	0.48
不明 (%)													
記載なし (%)													
総計 (%)	249 (64.5)	74 (19.2)	23 (6.0)	15 (3.9)	14 (3.6)	6 (1.6)	2 (0.5)	3 (0.8)	386 (100.0)	1,362	1,748	0.21	0.48

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査