

表 4275 残腎Kt/V 医療機関別 (PD・HD(F)等併用患者)

| 医療機関 | 0.1未満 | 0.1～ | 0.4～ | 0.8～ | 1.2～ | 1.7～ | 2.0～ | 2.4～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------|------|
| 国公立大学 | 17 | 5 | 3 | | | 1 | | | 26 | 43 | 69 | 0.15 | 0.36 |
| (%) | (65.4) | (19.2) | (11.5) | | | (3.8) | | | (100.0) | | | | |
| 私立大学 | 32 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | | | 54 | 112 | 166 | 0.18 | 0.37 |
| (%) | (59.3) | (25.9) | (3.7) | (7.4) | (1.9) | (1.9) | | | (100.0) | | | | |
| 国立 | 2 | | | | | | | | 2 | 15 | 17 | | |
| (%) | (100.0) | | | | | | | | (100.0) | | | | |
| 県市町村立 | 51 | 11 | 3 | 1 | | | | | 66 | 200 | 266 | 0.07 | 0.18 |
| (%) | (77.3) | (16.7) | (4.5) | (1.5) | | | | | (100.0) | | | | |
| 社会保険 | 5 | 2 | | 1 | | | | | 8 | 41 | 49 | 0.18 | 0.35 |
| (%) | (62.5) | (25.0) | | (12.5) | | | | | (100.0) | | | | |
| 厚生連 | 28 | 7 | | 1 | 1 | | | | 37 | 95 | 132 | 0.09 | 0.26 |
| (%) | (75.7) | (18.9) | | (2.7) | (2.7) | | | | (100.0) | | | | |
| その他公的 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | | | | 37 | 193 | 230 | 0.14 | 0.32 |
| (%) | (70.3) | (16.2) | (8.1) | (2.7) | (2.7) | | | | (100.0) | | | | |
| 私立総合 | 4 | | 1 | 2 | | | | | 7 | 115 | 122 | 0.36 | 0.48 |
| (%) | (57.1) | | (14.3) | (28.6) | | | | | (100.0) | | | | |
| 私立 | 40 | 22 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 83 | 303 | 386 | 0.35 | 0.60 |
| (%) | (48.2) | (26.5) | (9.6) | (3.6) | (6.0) | (2.4) | (2.4) | (1.2) | (100.0) | | | | |
| 私立診療所 | 44 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 2 | 66 | 245 | 311 | 0.35 | 0.70 |
| (%) | (66.7) | (10.6) | (4.5) | (3.0) | (9.1) | (3.0) | | (3.0) | (100.0) | | | | |
| 総計 | 249 | 74 | 23 | 15 | 14 | 6 | 2 | 3 | 386 | 1,362 | 1,748 | 0.21 | 0.48 |
| (%) | (64.5) | (19.2) | (6.0) | (3.9) | (3.6) | (1.6) | (0.5) | (0.8) | (100.0) | | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査