

表 4278 残腎Kt/V 一日透析液使用量(L/日)別 (PD・HD(F)等併用患者)

一日透析液使用量	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)	3 (75.0)			1 (25.0)					4 (100.0)	9	13	0.28	0.55
2～ (%)			1 (50.0)		1 (50.0)				2 (100.0)	20	22	0.90	0.42
4～ (%)	7 (36.8)	7 (36.8)	2 (10.5)	1 (5.3)	1 (5.3)			1 (5.3)	19 (100.0)	67	86	0.37	0.67
6～ (%)	79 (64.8)	23 (18.9)	7 (5.7)	3 (2.5)	5 (4.1)	4 (3.3)		1 (0.8)	122 (100.0)	180	302	0.22	0.49
8～ (%)	99 (71.7)	20 (14.5)	8 (5.8)	6 (4.3)	3 (2.2)	1 (0.7)	1 (0.7)		138 (100.0)	227	365	0.16	0.38
10～ (%)	35 (67.3)	9 (17.3)	3 (5.8)	3 (5.8)	1 (1.9)		1 (1.9)		52 (100.0)	83	135	0.19	0.42
12～ (%)	19 (61.3)	7 (22.6)		1 (3.2)	2 (6.5)	1 (3.2)		1 (3.2)	31 (100.0)	40	71	0.33	0.76
合計 (%)	242 (65.8)	66 (17.9)	21 (5.7)	15 (4.1)	13 (3.5)	6 (1.6)	2 (0.5)	3 (0.8)	368 (100.0)	626	994	0.21	0.49
記載なし (%)	7 (38.9)	8 (44.4)	2 (11.1)		1 (5.6)				18 (100.0)	736	754	0.19	0.29
総計 (%)	249 (64.5)	74 (19.2)	23 (6.0)	15 (3.9)	14 (3.6)	6 (1.6)	2 (0.5)	3 (0.8)	386 (100.0)	1,362	1,748	0.21	0.48
平均	8.26	8.24	7.64	7.86	8.24	8.37	9.10	10.67	8.23	7.70	7.90		
標準偏差	2.15	2.25	2.02	2.67	4.20	2.81	1.56	8.22	2.36	2.52	2.47		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査