

表 4285 残腎Kt/V 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

2014年中の出口 部感染発症率(回 /1患者・年)	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0	204	52	14	13	6	3	2	2	296	497	793	0.18	0.45
(%)	(68.9)	(17.6)	(4.7)	(4.4)	(2.0)	(1.0)	(0.7)	(0.7)	(100.0)				
1.0～	21	9	5	1	3	2		1	42	83	125	0.37	0.63
(%)	(50.0)	(21.4)	(11.9)	(2.4)	(7.1)	(4.8)		(2.4)	(100.0)				
2.0～	11	1			2	1			15	18	33	0.35	0.69
(%)	(73.3)	(6.7)			(13.3)	(6.7)			(100.0)				
3.0～	6		2		1				9	5	14	0.29	0.54
(%)	(66.7)		(22.2)		(11.1)				(100.0)				
4.0～	1			1					2	6	8	0.45	0.64
(%)	(50.0)			(50.0)					(100.0)				
5.0～	2	2							4	12	16	0.05	0.06
(%)	(50.0)	(50.0)							(100.0)				
合計	245	64	21	15	12	6	2	3	368	621	989	0.21	0.48
(%)	(66.6)	(17.4)	(5.7)	(4.1)	(3.3)	(1.6)	(0.5)	(0.8)	(100.0)				
不明 記載なし	4	10	2		2				18	741	759	0.29	0.37
(%)	(22.2)	(55.6)	(11.1)		(11.1)				(100.0)				
総計	249	74	23	15	14	6	2	3	386	1,362	1,748	0.21	0.48
(%)	(64.5)	(19.2)	(6.0)	(3.9)	(3.6)	(1.6)	(0.5)	(0.8)	(100.0)				
平均	0.31	0.38	0.52	0.36	0.83	0.67		0.33	0.36	0.38	0.37		
標準偏差	0.84	1.21	0.93	1.07	1.03	0.82		0.58	0.93	1.07	1.02		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査