

表 4302 PD Kt/V 大腿骨頸部骨折の既往別（腹膜透析患者）

大腿骨頸部骨折 の既往	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし (%)	12 (100.0)	148 (98.0)	245 (97.6)	441 (98.9)	777 (98.1)	275 (98.2)	136 (96.5)	85 (100.0)	2,119 (98.2)	3,612 (97.4)	5,731 (97.7)	1.30	0.78
既往あり (%)		3 (2.0)	6 (2.4)	5 (1.1)	15 (1.9)	5 (1.8)	5 (3.5)		39 (1.8)	95 (2.6)	134 (2.3)	1.28	0.59
合計 (%)	12 (100.0)	151 (100.0)	251 (100.0)	446 (100.0)	792 (100.0)	280 (100.0)	141 (100.0)	85 (100.0)	2,158 (100.0)	3,707 (100.0)	5,865 (100.0)	1.30	0.78
不明				1	3				4	51	55	1.30	0.16
記載なし	7	12	18	51	71	36	22	6	223	2,798	3,021	1.30	0.59
総計	19	163	269	498	866	316	163	91	2,385	6,556	8,941	1.30	0.76

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査