

表 4303 PD Kt/V 降圧薬使用の有無別（腹膜透析患者）

降圧薬使用の有無	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	4	49	74	88	145	65	28	14	467	820	1,287	1.19	0.72
(%)	(30.8)	(30.6)	(29.7)	(18.8)	(17.6)	(21.5)	(18.5)	(15.9)	(20.7)	(20.9)	(20.8)		
あり	9	111	175	380	677	237	123	74	1,786	3,106	4,892	1.33	0.79
(%)	(69.2)	(69.4)	(70.3)	(81.2)	(82.4)	(78.5)	(81.5)	(84.1)	(79.3)	(79.1)	(79.2)		
合計	13	160	249	468	822	302	151	88	2,253	3,926	6,179	1.30	0.77
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		1	5	5	11	2		1	25	46	71	1.19	0.50
記載なし	6	2	15	25	33	12	12	2	107	2,584	2,691	1.25	0.61
総計	19	163	269	498	866	316	163	91	2,385	6,556	8,941	1.30	0.76

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査