

表 4306 PD Kt/V 身長(cm)別 (腹膜透析患者)

身長	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)		3 (11.5)	2 (7.7)	2 (7.7)	4 (15.4)	2 (7.7)	7 (26.9)	6 (23.1)	26 (100.0)	36	62	1.69	0.94
130～ (%)					1 (50.0)		1 (50.0)		2 (100.0)	9	11	1.85	0.64
135～ (%)		2 (11.8)	1 (5.9)	5 (29.4)	4 (23.5)	4 (23.5)		1 (5.9)	17 (100.0)	45	62	1.32	0.72
140～ (%)	1 (1.4)	7 (9.5)	8 (10.8)	4 (5.4)	32 (43.2)	10 (13.5)	8 (10.8)	4 (5.4)	74 (100.0)	153	227	1.40	0.76
145～ (%)		7 (4.4)	17 (10.8)	36 (22.8)	56 (35.4)	19 (12.0)	14 (8.9)	9 (5.7)	158 (100.0)	312	470	1.42	1.00
150～ (%)	1 (0.4)	21 (7.6)	26 (9.4)	48 (17.3)	98 (35.3)	51 (18.3)	23 (8.3)	10 (3.6)	278 (100.0)	589	867	1.33	0.59
155～ (%)	2 (0.5)	24 (6.5)	40 (10.8)	65 (17.5)	127 (34.2)	63 (17.0)	33 (8.9)	17 (4.6)	371 (100.0)	678	1,049	1.36	0.76
160～ (%)	3 (0.7)	36 (8.1)	38 (8.5)	94 (21.0)	176 (39.4)	57 (12.8)	26 (5.8)	17 (3.8)	447 (100.0)	883	1,330	1.31	0.75
165～ (%)	1 (0.2)	29 (6.7)	52 (12.0)	121 (27.9)	147 (33.9)	49 (11.3)	21 (4.8)	13 (3.0)	433 (100.0)	779	1,212	1.23	0.73
170～ (%)	3 (1.0)	13 (4.3)	48 (15.9)	62 (20.6)	123 (40.9)	30 (10.0)	12 (4.0)	10 (3.3)	301 (100.0)	603	904	1.27	0.84
175～ (%)		14 (12.1)	21 (18.1)	26 (22.4)	37 (31.9)	9 (7.8)	6 (5.2)	3 (2.6)	116 (100.0)	250	366	1.13	0.89
180～ (%)	1 (2.9)	3 (8.6)	5 (14.3)	8 (22.9)	12 (34.3)	4 (11.4)	2 (5.7)		35 (100.0)	52	87	1.13	0.56
185～ (%)			1 (50.0)		1 (50.0)				2 (100.0)	11	13	1.15	0.64
190～ (%)										4	4		
合計 (%)	12 (0.5)	159 (7.0)	259 (11.5)	471 (20.8)	818 (36.2)	298 (13.2)	153 (6.8)	90 (4.0)	2,260 (100.0)	4,404	6,664	1.30	0.77
記載なし (%)	7 (5.6)	4 (3.2)	10 (8.0)	27 (21.6)	48 (38.4)	18 (14.4)	10 (8.0)	1 (0.8)	125 (100.0)	2,152	2,277	1.24	0.56
総計 (%)	19 (0.8)	163 (6.8)	269 (11.3)	498 (20.9)	866 (36.3)	316 (13.2)	163 (6.8)	91 (3.8)	2,385 (100.0)	6,556	8,941	1.30	0.76
平均	162.92	160.10	162.70	162.19	161.04	159.24	156.01	154.67	160.58	160.54	160.56		
標準偏差	10.17	12.46	10.18	9.35	10.45	10.31	16.73	19.82	11.55	11.62	11.59		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査