

表 4310 PD Kt/V クレアチニン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

クレアチニン 濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)					1 (100.0)				1 (100.0)	16	17	1.20	
2～ (%)		3 (7.9)	9 (23.7)	9 (23.7)	10 (26.3)	2 (5.3)	2 (5.3)	3 (7.9)	38 (100.0)	116	154	1.15	0.73
4～ (%)	1 (0.6)	8 (4.8)	27 (16.2)	42 (25.1)	51 (30.5)	13 (7.8)	9 (5.4)	16 (9.6)	167 (100.0)	408	575	1.28	0.68
6～ (%)	1 (0.3)	12 (3.1)	45 (11.6)	115 (29.6)	134 (34.4)	38 (9.8)	26 (6.7)	18 (4.6)	389 (100.0)	744	1,133	1.32	0.75
8～ (%)	3 (0.6)	27 (5.4)	51 (10.2)	119 (23.8)	176 (35.2)	68 (13.6)	37 (7.4)	19 (3.8)	500 (100.0)	849	1,349	1.32	0.81
10～ (%)	1 (0.2)	36 (8.4)	37 (8.6)	71 (16.5)	165 (38.4)	71 (16.5)	34 (7.9)	15 (3.5)	430 (100.0)	685	1,115	1.34	0.74
12～ (%)	4 (1.3)	15 (4.7)	22 (6.9)	57 (17.9)	139 (43.7)	49 (15.4)	24 (7.5)	8 (2.5)	318 (100.0)	530	848	1.40	0.80
14～ (%)	1 (0.5)	7 (3.5)	9 (4.5)	37 (18.3)	95 (47.0)	38 (18.8)	10 (5.0)	5 (2.5)	202 (100.0)	286	488	1.40	0.69
16～ (%)	1 (1.1)	4 (4.3)	3 (3.2)	17 (18.3)	42 (45.2)	19 (20.4)	5 (5.4)	2 (2.2)	93 (100.0)	202	295	1.44	0.89
合計 (%)	12 (0.6)	112 (5.2)	203 (9.5)	467 (21.8)	813 (38.0)	298 (13.9)	147 (6.9)	86 (4.0)	2,138 (100.0)	3,836	5,974	1.34	0.76
記載なし (%)	7 (2.8)	51 (20.6)	66 (26.7)	31 (12.6)	53 (21.5)	18 (7.3)	16 (6.5)	5 (2.0)	247 (100.0)	2,720	2,967	0.93	0.66
総計 (%)	19 (0.8)	163 (6.8)	269 (11.3)	498 (20.9)	866 (36.3)	316 (13.2)	163 (6.8)	91 (3.8)	2,385 (100.0)	6,556	8,941	1.30	0.76
平均	11.16	10.22	8.90	9.58	10.53	10.92	10.09	8.80	10.11	9.76	9.89		
標準偏差	3.68	3.24	3.23	3.38	3.33	3.23	3.16	3.24	3.36	3.61	3.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査