

表 4311 PD Kt/V アルブミン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

アルブミン 濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)					1 (50.0)		1 (50.0)		2 (100.0)	13	15	1.70	0.42
1.5～ (%)		1 (5.0)	1 (5.0)	2 (10.0)	11 (55.0)	3 (15.0)	2 (10.0)		20 (100.0)	51	71	1.40	0.46
2.0～ (%)		2 (2.5)	6 (7.6)	24 (30.4)	31 (39.2)	8 (10.1)	6 (7.6)	2 (2.5)	79 (100.0)	219	298	1.28	0.49
2.5～ (%)	1 (0.3)	10 (3.1)	26 (8.0)	73 (22.5)	134 (41.2)	43 (13.2)	23 (7.1)	15 (4.6)	325 (100.0)	712	1,037	1.41	0.87
3.0～ (%)	6 (0.8)	46 (5.8)	66 (8.4)	159 (20.2)	308 (39.0)	118 (15.0)	51 (6.5)	35 (4.4)	789 (100.0)	1,369	2,158	1.38	0.85
3.5～ (%)	4 (0.5)	43 (5.8)	82 (11.1)	161 (21.8)	270 (36.6)	104 (14.1)	46 (6.2)	27 (3.7)	737 (100.0)	1,169	1,906	1.30	0.69
4.0～ (%)		8 (4.7)	23 (13.5)	42 (24.7)	55 (32.4)	21 (12.4)	15 (8.8)	6 (3.5)	170 (100.0)	261	431	1.28	0.57
4.5～ (%)			1 (12.5)	4 (50.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)		8 (100.0)	13	21	1.18	0.49
5.0～ (%)		1 (100.0)							1 (100.0)	1	2	0.30	
合計 (%)	11 (0.5)	111 (5.2)	205 (9.6)	465 (21.8)	811 (38.1)	298 (14.0)	145 (6.8)	85 (4.0)	2,131 (100.0)	3,808	5,939	1.34	0.76
記載なし (%)	8 (3.1)	52 (20.5)	64 (25.2)	33 (13.0)	55 (21.7)	18 (7.1)	18 (7.1)	6 (2.4)	254 (100.0)	2,748	3,002	0.94	0.67
総計 (%)	19 (0.8)	163 (6.8)	269 (11.3)	498 (20.9)	866 (36.3)	316 (13.2)	163 (6.8)	91 (3.8)	2,385 (100.0)	6,556	8,941	1.30	0.76
平均	3.32	3.42	3.42	3.34	3.30	3.34	3.33	3.33	3.33	3.25	3.28		
標準偏差	0.35	0.46	0.49	0.51	0.49	0.46	0.57	0.42	0.49	0.53	0.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査