

表 4313 PD Kt/V 補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

補正 カルシウム濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)			1 (16.7)		3 (50.0)	1 (16.7)	1 (16.7)		6 (100.0)	23	29	1.37	0.48
7.0～ (%)			3 (30.0)		5 (50.0)	1 (10.0)		1 (10.0)	10 (100.0)	26	36	1.27	0.57
7.5～ (%)			3 (10.7)	10 (35.7)	11 (39.3)	1 (3.6)	2 (7.1)	1 (3.6)	28 (100.0)	99	127	1.25	0.51
8.0～ (%)		3 (3.6)	11 (13.3)	18 (21.7)	33 (39.8)	9 (10.8)	6 (7.2)	3 (3.6)	83 (100.0)	203	286	1.36	1.00
8.4～ (%)		4 (15.4)	3 (11.5)	3 (11.5)	7 (26.9)	6 (23.1)	1 (3.8)	2 (7.7)	26 (100.0)	60	86	1.38	1.00
8.5～ (%)	3 (0.9)	10 (2.9)	47 (13.9)	85 (25.1)	124 (36.6)	34 (10.0)	17 (5.0)	19 (5.6)	339 (100.0)	567	906	1.34	0.94
9.0～ (%)	2 (0.3)	37 (6.0)	63 (10.2)	133 (21.6)	244 (39.6)	80 (13.0)	37 (6.0)	20 (3.2)	616 (100.0)	986	1,602	1.30	0.71
9.5～ (%)	4 (0.6)	39 (6.3)	55 (8.9)	153 (24.8)	222 (35.9)	87 (14.1)	41 (6.6)	17 (2.8)	618 (100.0)	1,011	1,629	1.30	0.67
10.0～ (%)	1 (1.3)	2 (2.6)	3 (3.9)	11 (14.5)	32 (42.1)	19 (25.0)	6 (7.9)	2 (2.6)	76 (100.0)	115	191	1.44	0.50
10.1～ (%)		12 (6.2)	10 (5.2)	35 (18.0)	75 (38.7)	35 (18.0)	18 (9.3)	9 (4.6)	194 (100.0)	363	557	1.45	0.83
10.5～ (%)		4 (4.5)	4 (4.5)	11 (12.4)	34 (38.2)	18 (20.2)	11 (12.4)	7 (7.9)	89 (100.0)	207	296	1.58	0.87
11.0～ (%)			2 (6.9)	4 (13.8)	12 (41.4)	4 (13.8)	4 (13.8)	3 (10.3)	29 (100.0)	82	111	1.56	0.63
11.5～ (%)				1 (11.1)	7 (77.8)	1 (11.1)			9 (100.0)	20	29	1.40	0.29
12.0～ (%)				1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)		1 (20.0)	5 (100.0)	22	27	1.54	0.55
合計 (%)	10 (0.5)	111 (5.2)	205 (9.6)	465 (21.9)	811 (38.1)	297 (14.0)	144 (6.8)	85 (4.0)	2,128 (100.0)	3,784	5,912	1.34	0.76
記載なし (%)	9 (3.5)	52 (20.2)	64 (24.9)	33 (12.8)	55 (21.4)	19 (7.4)	19 (7.4)	6 (2.3)	257 (100.0)	2,772	3,029	0.95	0.68
総計 (%)	19 (0.8)	163 (6.8)	269 (11.3)	498 (20.9)	866 (36.3)	316 (13.2)	163 (6.8)	91 (3.8)	2,385 (100.0)	6,556	8,941	1.30	0.76
平均	9.40	9.48	9.21	9.35	9.42	9.53	9.53	9.49	9.41	9.40	9.41		
標準偏差	0.49	0.54	0.68	0.65	0.74	0.73	0.79	0.85	0.72	0.84	0.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査