

表 4316 PD Kt/V PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			4 (22.2)	2 (11.1)	8 (44.4)		2 (11.1)	2 (11.1)	18 (100.0)	22	40	1.34	0.64
20～ (%)		3 (10.0)	3 (10.0)	10 (33.3)	11 (36.7)	3 (10.0)			30 (100.0)	15	45	1.08	0.42
35～ (%)		2 (7.1)	3 (10.7)	2 (7.1)	14 (50.0)	4 (14.3)	1 (3.6)	2 (7.1)	28 (100.0)	27	55	1.37	0.58
50～ (%)		3 (6.4)	5 (10.6)	12 (25.5)	18 (38.3)	7 (14.9)	1 (2.1)	1 (2.1)	47 (100.0)	30	77	1.22	0.53
75～ (%)		4 (9.3)	6 (14.0)	5 (11.6)	16 (37.2)	7 (16.3)	4 (9.3)	1 (2.3)	43 (100.0)	26	69	1.29	0.61
100～ (%)		5 (10.4)	8 (16.7)	10 (20.8)	16 (33.3)	4 (8.3)	3 (6.3)	2 (4.2)	48 (100.0)	23	71	1.24	0.94
125～ (%)			6 (20.0)	8 (26.7)	12 (40.0)	4 (13.3)			30 (100.0)	15	45	1.19	0.45
150～ (%)			1 (100.0)						1 (100.0)		1	0.50	
151～ (%)		1 (3.6)	7 (25.0)	4 (14.3)	10 (35.7)	1 (3.6)	4 (14.3)	1 (3.6)	28 (100.0)	15	43	1.26	0.62
180～ (%)		1 (6.3)	3 (18.8)	3 (18.8)	5 (31.3)	2 (12.5)		2 (12.5)	16 (100.0)	18	34	1.34	0.76
210～ (%)		3 (15.0)	3 (15.0)	4 (20.0)	6 (30.0)	3 (15.0)		1 (5.0)	20 (100.0)	7	27	1.13	0.60
240～ (%)			1 (10.0)	4 (40.0)	4 (40.0)	1 (10.0)			10 (100.0)	13	23	1.15	0.40
300～ (%)			1 (11.1)	5 (55.6)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)		9 (100.0)	10	19	1.18	0.50
350～ (%)			1 (25.0)		3 (75.0)				4 (100.0)	4	8	1.10	0.27
400～ (%)		1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	4 (57.1)				7 (100.0)	4	11	1.04	0.44
500～ (%)				1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)			6 (100.0)	5	11	1.42	0.34
合計 (%)		23 (6.7)	53 (15.4)	71 (20.6)	132 (38.3)	38 (11.0)	16 (4.6)	12 (3.5)	345 (100.0)	234	579	1.23	0.62
記載なし (%)		45 (47.4)	46 (48.4)	1 (1.1)	2 (2.1)	1 (1.1)			95 (100.0)	45	140	0.40	0.23
総計 (%)		68 (15.5)	99 (22.5)	72 (16.4)	134 (30.5)	39 (8.9)	16 (3.6)	12 (2.7)	440 (100.0)	279	719	1.05	0.66
平均		118.96	126.62	135.23	134.67	120.97	111.06	101.83	128.76	138.16	132.56		
標準偏差		104.31	86.38	112.34	135.34	102.24	79.00	74.06	114.08	149.22	129.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査