

表 4317 PD Kt/V ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

ヘモグロビン 濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)										7	7		
5～ (%)				1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)	12	14	1.15	0.35
6～ (%)				2 (25.0)	5 (62.5)	1 (12.5)			8 (100.0)	20	28	1.31	0.24
7～ (%)		1 (3.6)	3 (10.7)	3 (10.7)	12 (42.9)	7 (25.0)	1 (3.6)	1 (3.6)	28 (100.0)	96	124	1.39	0.54
8～ (%)	1 (0.9)	4 (3.8)	6 (5.7)	17 (16.0)	44 (41.5)	19 (17.9)	10 (9.4)	5 (4.7)	106 (100.0)	238	344	1.44	0.57
9～ (%)	4 (1.3)	14 (4.6)	26 (8.6)	58 (19.1)	133 (43.9)	36 (11.9)	21 (6.9)	11 (3.6)	303 (100.0)	600	903	1.39	0.96
10～ (%)	3 (0.5)	26 (4.1)	59 (9.3)	134 (21.2)	249 (39.3)	92 (14.5)	38 (6.0)	32 (5.1)	633 (100.0)	1,073	1,706	1.37	0.76
11～ (%)	2 (0.3)	39 (5.8)	66 (9.9)	153 (22.9)	252 (37.7)	88 (13.2)	47 (7.0)	21 (3.1)	668 (100.0)	1,041	1,709	1.31	0.73
12～ (%)	1 (0.4)	22 (8.0)	30 (10.9)	75 (27.2)	79 (28.6)	41 (14.9)	17 (6.2)	11 (4.0)	276 (100.0)	520	796	1.28	0.75
13～ (%)		5 (6.2)	13 (16.0)	18 (22.2)	27 (33.3)	8 (9.9)	7 (8.6)	3 (3.7)	81 (100.0)	156	237	1.23	0.57
14～ (%)		1 (4.0)	3 (12.0)	5 (20.0)	5 (20.0)	3 (12.0)	6 (24.0)	2 (8.0)	25 (100.0)	54	79	1.51	0.73
合計 (%)	11 (0.5)	112 (5.3)	206 (9.7)	466 (21.9)	807 (37.9)	295 (13.8)	147 (6.9)	86 (4.0)	2,130 (100.0)	3,817	5,947	1.34	0.77
記載なし (%)	8 (3.1)	51 (20.0)	63 (24.7)	32 (12.5)	59 (23.1)	21 (8.2)	16 (6.3)	5 (2.0)	255 (100.0)	2,739	2,994	0.95	0.66
総計 (%)	19 (0.8)	163 (6.8)	269 (11.3)	498 (20.9)	866 (36.3)	316 (13.2)	163 (6.8)	91 (3.8)	2,385 (100.0)	6,556	8,941	1.30	0.76
平均	10.37	11.09	11.08	11.02	10.74	10.81	10.97	10.88	10.88	10.77	10.81		
標準偏差	1.24	1.26	1.27	1.26	1.28	1.29	1.50	1.31	1.30	1.48	1.42		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査