

表 4318 PD Kt/V 総コレステロール濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

総コレステロール濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)			1 (5.6)	5 (27.8)	5 (27.8)	7 (38.9)			18 (100.0)	32	50	1.39	0.39
100～ (%)	2 (3.3)		5 (8.2)	10 (16.4)	33 (54.1)	5 (8.2)	4 (6.6)	2 (3.3)	61 (100.0)	99	160	1.49	1.30
120～ (%)		12 (7.0)	12 (7.0)	37 (21.5)	72 (41.9)	17 (9.9)	16 (9.3)	6 (3.5)	172 (100.0)	276	448	1.35	0.75
140～ (%)	1 (0.3)	19 (6.1)	36 (11.6)	63 (20.3)	119 (38.4)	45 (14.5)	13 (4.2)	14 (4.5)	310 (100.0)	496	806	1.30	0.69
160～ (%)	3 (0.9)	15 (4.3)	27 (7.7)	66 (18.9)	149 (42.7)	48 (13.8)	24 (6.9)	17 (4.9)	349 (100.0)	516	865	1.41	0.82
180～ (%)	2 (0.6)	16 (4.4)	36 (10.0)	74 (20.6)	129 (35.8)	65 (18.1)	25 (6.9)	13 (3.6)	360 (100.0)	473	833	1.36	0.73
200～ (%)		13 (6.0)	21 (9.7)	52 (24.0)	76 (35.0)	28 (12.9)	16 (7.4)	11 (5.1)	217 (100.0)	347	564	1.36	0.84
220～ (%)		9 (7.8)	9 (7.8)	16 (13.8)	48 (41.4)	18 (15.5)	10 (8.6)	6 (5.2)	116 (100.0)	202	318	1.44	0.93
240～ (%)		3 (5.7)	4 (7.5)	7 (13.2)	19 (35.8)	9 (17.0)	7 (13.2)	4 (7.5)	53 (100.0)	106	159	1.55	0.86
260～ (%)		2 (3.4)	3 (5.1)	18 (30.5)	21 (35.6)	4 (6.8)	7 (11.9)	4 (6.8)	59 (100.0)	90	149	1.38	0.56
合計 (%)	8 (0.5)	89 (5.2)	154 (9.0)	348 (20.3)	671 (39.1)	246 (14.3)	122 (7.1)	77 (4.5)	1,715 (100.0)	2,637	4,352	1.37	0.80
記載なし (%)	11 (1.6)	74 (11.0)	115 (17.2)	150 (22.4)	195 (29.1)	70 (10.4)	41 (6.1)	14 (2.1)	670 (100.0)	3,919	4,589	1.12	0.64
総計 (%)	19 (0.8)	163 (6.8)	269 (11.3)	498 (20.9)	866 (36.3)	316 (13.2)	163 (6.8)	91 (3.8)	2,385 (100.0)	6,556	8,941	1.30	0.76
平均	155.25	180.44	176.81	179.99	177.15	178.46	186.34	186.51	179.02	179.00	179.01		
標準偏差	34.37	35.83	35.13	41.09	40.99	36.78	44.83	45.03	40.20	40.76	40.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査