

表 4319 PD Kt/V HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (50.0)		1 (50.0)					2 (100.0)	6	8	0.55	0.64
20～ (%)	3 (2.6)	6 (5.2)	12 (10.4)	23 (20.0)	51 (44.3)	13 (11.3)	6 (5.2)	1 (0.9)	115 (100.0)	173	288	1.18	0.51
30～ (%)	2 (0.6)	16 (4.5)	47 (13.1)	95 (26.5)	127 (35.5)	44 (12.3)	17 (4.7)	10 (2.8)	358 (100.0)	575	933	1.27	0.70
40～ (%)	2 (0.5)	15 (3.8)	37 (9.4)	91 (23.2)	156 (39.7)	52 (13.2)	23 (5.9)	17 (4.3)	393 (100.0)	597	990	1.33	0.67
50～ (%)	1 (0.3)	21 (6.0)	31 (8.9)	53 (15.2)	139 (39.8)	60 (17.2)	24 (6.9)	20 (5.7)	349 (100.0)	490	839	1.47	1.04
60～ (%)		6 (2.6)	16 (7.0)	44 (19.2)	102 (44.5)	31 (13.5)	13 (5.7)	17 (7.4)	229 (100.0)	287	516	1.47	0.82
70～ (%)	1 (0.9)	4 (3.7)	7 (6.4)	23 (21.1)	42 (38.5)	20 (18.3)	10 (9.2)	2 (1.8)	109 (100.0)	150	259	1.46	0.96
80～ (%)		2 (3.6)	2 (3.6)	13 (23.2)	22 (39.3)	8 (14.3)	7 (12.5)	2 (3.6)	56 (100.0)	85	141	1.41	0.50
90～ (%)		1 (4.3)	1 (4.3)	6 (26.1)	8 (34.8)	2 (8.7)	3 (13.0)	2 (8.7)	23 (100.0)	38	61	1.43	0.60
100～ (%)		1 (4.3)	1 (4.3)	3 (13.0)	10 (43.5)	6 (26.1)	2 (8.7)		23 (100.0)	34	57	1.42	0.45
合計 (%)	9 (0.5)	73 (4.4)	154 (9.3)	352 (21.2)	657 (39.6)	236 (14.2)	105 (6.3)	71 (4.3)	1,657 (100.0)	2,435	4,092	1.37	0.80
記載なし (%)	10 (1.4)	90 (12.4)	115 (15.8)	146 (20.1)	209 (28.7)	80 (11.0)	58 (8.0)	20 (2.7)	728 (100.0)	4,121	4,849	1.14	0.66
総計 (%)	19 (0.8)	163 (6.8)	269 (11.3)	498 (20.9)	866 (36.3)	316 (13.2)	163 (6.8)	91 (3.8)	2,385 (100.0)	6,556	8,941	1.30	0.76
平均	40.11	49.05	46.76	49.50	51.19	52.94	54.84	54.24	50.88	50.20	50.47		
標準偏差	17.28	16.65	14.90	18.13	17.95	18.37	18.88	14.31	17.75	17.70	17.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査