

表 4320 PD Kt/V Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

Non-HDL-C濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)			1 (9.1)	2 (18.2)	5 (45.5)	2 (18.2)	1 (9.1)		11 (100.0)	7	18	1.35	0.43
50～ (%)	1 (2.0)		3 (6.0)	10 (20.0)	22 (44.0)	10 (20.0)	1 (2.0)	3 (6.0)	50 (100.0)	64	114	1.59	1.40
70～ (%)	2 (1.4)	2 (1.4)	12 (8.6)	24 (17.1)	71 (50.7)	14 (10.0)	11 (7.9)	4 (2.9)	140 (100.0)	211	351	1.38	0.76
90～ (%)	1 (0.4)	11 (4.1)	20 (7.5)	65 (24.3)	100 (37.3)	42 (15.7)	12 (4.5)	17 (6.3)	268 (100.0)	392	660	1.39	0.77
110～ (%)		9 (2.8)	34 (10.5)	60 (18.5)	139 (42.8)	48 (14.8)	23 (7.1)	12 (3.7)	325 (100.0)	472	797	1.40	0.72
130～ (%)	3 (1.0)	8 (2.8)	21 (7.2)	73 (25.2)	111 (38.3)	44 (15.2)	18 (6.2)	12 (4.1)	290 (100.0)	372	662	1.38	0.78
150～ (%)		12 (6.6)	23 (12.6)	28 (15.3)	68 (37.2)	27 (14.8)	16 (8.7)	9 (4.9)	183 (100.0)	253	436	1.42	1.05
170～ (%)	1 (0.9)	9 (8.1)	7 (6.3)	22 (19.8)	45 (40.5)	16 (14.4)	5 (4.5)	6 (5.4)	111 (100.0)	152	263	1.32	0.64
190～ (%)		3 (7.7)	5 (12.8)	8 (20.5)	13 (33.3)	5 (12.8)	4 (10.3)	1 (2.6)	39 (100.0)	81	120	1.33	0.88
210～ (%)			2 (5.9)	10 (29.4)	17 (50.0)	1 (2.9)	2 (5.9)	2 (5.9)	34 (100.0)	56	90	1.39	0.48
合計 (%)	8 (0.6)	54 (3.7)	128 (8.8)	302 (20.8)	591 (40.7)	209 (14.4)	93 (6.4)	66 (4.5)	1,451 (100.0)	2,060	3,511	1.39	0.81
記載なし (%)	11 (1.2)	109 (11.7)	141 (15.1)	196 (21.0)	275 (29.4)	107 (11.5)	70 (7.5)	25 (2.7)	934 (100.0)	4,496	5,430	1.16	0.66
総計 (%)	19 (0.8)	163 (6.8)	269 (11.3)	498 (20.9)	866 (36.3)	316 (13.2)	163 (6.8)	91 (3.8)	2,385 (100.0)	6,556	8,941	1.30	0.76
平均	114.00	140.35	130.16	128.94	126.80	125.58	129.52	128.29	128.04	128.77	128.47		
標準偏差	36.84	34.33	36.25	37.74	39.77	33.37	35.11	38.10	37.63	38.29	38.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査