

表 4321 PD Kt/V 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)				1 (100.0)					1 (100.0)		1	1.10	
60～ (%)		1 (20.0)		2 (40.0)	1 (20.0)		1 (20.0)		5 (100.0)	8	13	1.20	0.69
80～ (%)		5 (11.1)	2 (4.4)	4 (8.9)	19 (42.2)	6 (13.3)	7 (15.6)	2 (4.4)	45 (100.0)	79	124	1.40	0.63
100～ (%)		9 (3.6)	28 (11.2)	57 (22.8)	95 (38.0)	29 (11.6)	24 (9.6)	8 (3.2)	250 (100.0)	391	641	1.33	0.59
120～ (%)	5 (0.8)	21 (3.5)	60 (10.0)	146 (24.3)	214 (35.7)	95 (15.8)	35 (5.8)	24 (4.0)	600 (100.0)	916	1,516	1.35	0.81
140～ (%)	3 (0.5)	30 (4.8)	61 (9.8)	137 (22.0)	250 (40.2)	78 (12.5)	41 (6.6)	22 (3.5)	622 (100.0)	957	1,579	1.34	0.74
160～ (%)	1 (0.3)	14 (4.8)	35 (11.9)	57 (19.4)	117 (39.8)	31 (10.5)	19 (6.5)	20 (6.8)	294 (100.0)	427	721	1.40	1.00
180～ (%)	2 (2.4)	7 (8.3)	7 (8.3)	8 (9.5)	36 (42.9)	15 (17.9)	3 (3.6)	6 (7.1)	84 (100.0)	133	217	1.37	0.70
200～ (%)		1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	2 (20.0)		10 (100.0)	21	31	1.35	0.59
220～ (%)				3 (75.0)	1 (25.0)				4 (100.0)	6	10	1.13	0.05
合計 (%)	11 (0.6)	88 (4.6)	194 (10.1)	416 (21.7)	736 (38.4)	256 (13.4)	132 (6.9)	82 (4.3)	1,915 (100.0)	2,938	4,853	1.35	0.78
記載なし (%)	8 (1.7)	75 (16.0)	75 (16.0)	82 (17.4)	130 (27.7)	60 (12.8)	31 (6.6)	9 (1.9)	470 (100.0)	3,618	4,088	1.09	0.64
総計 (%)	19 (0.8)	163 (6.8)	269 (11.3)	498 (20.9)	866 (36.3)	316 (13.2)	163 (6.8)	91 (3.8)	2,385 (100.0)	6,556	8,941	1.30	0.76
平均	149.36	143.40	141.53	139.63	141.68	140.64	137.25	145.20	141.05	140.99	141.01		
標準偏差	25.40	26.66	21.89	22.04	22.51	22.57	24.21	23.88	22.78	22.95	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査