

表 4325 PD Kt/V 使用透析液の種類別（腹膜透析患者）

使用透析液の種類	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5%液のみ	5	63	129	254	275	93	71	31	921	1,354	2,275	1.21	0.66
(%)	(0.5)	(6.8)	(14.0)	(27.6)	(29.9)	(10.1)	(7.7)	(3.4)	(100.0)				
1.5%液と2.5%液の併用	2	33	42	42	120	51	19	17	326	461	787	1.35	1.03
(%)	(0.6)	(10.1)	(12.9)	(12.9)	(36.8)	(15.6)	(5.8)	(5.2)	(100.0)				
2.5%液のみ		9	8	14	17	6	4	4	62	115	177	1.25	0.85
(%)		(14.5)	(12.9)	(22.6)	(27.4)	(9.7)	(6.5)	(6.5)	(100.0)				
4.25%液のみ(イコデキストリンなし)					1	1	2		4	4	8	1.90	0.28
(%)					(25.0)	(25.0)	(50.0)		(100.0)				
イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)		3	5	4	3	1		1	17	40	57	0.89	0.59
(%)		(17.6)	(29.4)	(23.5)	(17.6)	(5.9)		(5.9)	(100.0)				
1.5%+イコデキストリン	6	17	37	106	237	77	34	19	533	689	1,222	1.36	0.57
(%)	(1.1)	(3.2)	(6.9)	(19.9)	(44.5)	(14.4)	(6.4)	(3.6)	(100.0)				
1.5%+2.5%+イコデキストリン	1	22	14	26	118	54	19	14	268	291	559	1.53	1.07
(%)	(0.4)	(8.2)	(5.2)	(9.7)	(44.0)	(20.1)	(7.1)	(5.2)	(100.0)				
2.5%+イコデキストリン	5	13	17	32	79	30	13	4	193	248	441	1.29	0.61
(%)	(2.6)	(6.7)	(8.8)	(16.6)	(40.9)	(15.5)	(6.7)	(2.1)	(100.0)				
4.25%液+イコデキストリン			1					1	2	4	6	1.70	1.84
(%)			(50.0)					(50.0)	(100.0)				
合計	19	160	253	478	850	313	162	91	2,326	3,206	5,532	1.31	0.77
(%)	(0.8)	(6.9)	(10.9)	(20.6)	(36.5)	(13.5)	(7.0)	(3.9)	(100.0)				
不明			16	17	13	3			49	16	65	1.03	0.35
(%)			(32.7)	(34.7)	(26.5)	(6.1)			(100.0)				
記載なし		3		3	3		1		10	3,334	3,344	1.02	0.64
(%)		(30.0)		(30.0)	(30.0)		(10.0)		(100.0)				
総計	19	163	269	498	866	316	163	91	2,385	6,556	8,941	1.30	0.76
(%)	(0.8)	(6.8)	(11.3)	(20.9)	(36.3)	(13.2)	(6.8)	(3.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査