

表 4326 PD Kt/V 一日透析液使用量(L/日)別（腹膜透析患者）

一日透析液使用量	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満	1	7	9	6	9	3	5	1	41	78	119	1.02	0.69
(%)	(2.4)	(17.1)	(22.0)	(14.6)	(22.0)	(7.3)	(12.2)	(2.4)	(100.0)				
2～	1	14	60	41	15	8	4	5	148	245	393	0.90	0.59
(%)	(0.7)	(9.5)	(40.5)	(27.7)	(10.1)	(5.4)	(2.7)	(3.4)	(100.0)				
4～	3	52	79	156	122	28	17	16	473	599	1,072	1.05	0.59
(%)	(0.6)	(11.0)	(16.7)	(33.0)	(25.8)	(5.9)	(3.6)	(3.4)	(100.0)				
6～	6	53	72	176	337	105	64	35	848	947	1,795	1.33	0.69
(%)	(0.7)	(6.3)	(8.5)	(20.8)	(39.7)	(12.4)	(7.5)	(4.1)	(100.0)				
8～	6	25	27	59	254	106	50	16	543	863	1,406	1.47	0.82
(%)	(1.1)	(4.6)	(5.0)	(10.9)	(46.8)	(19.5)	(9.2)	(2.9)	(100.0)				
10～	1	5	4	29	73	39	16	13	180	230	410	1.67	1.16
(%)	(0.6)	(2.8)	(2.2)	(16.1)	(40.6)	(21.7)	(8.9)	(7.2)	(100.0)				
12～		5	2	13	37	22	6	5	90	111	201	1.52	0.66
(%)		(5.6)	(2.2)	(14.4)	(41.1)	(24.4)	(6.7)	(5.6)	(100.0)				
合計	18	161	253	480	847	311	162	91	2,323	3,073	5,396	1.31	0.77
(%)	(0.8)	(6.9)	(10.9)	(20.7)	(36.5)	(13.4)	(7.0)	(3.9)	(100.0)				
記載なし	1	2	16	18	19	5	1		62	3,483	3,545	1.06	0.43
(%)	(1.6)	(3.2)	(25.8)	(29.0)	(30.6)	(8.1)	(1.6)		(100.0)				
総計	19	163	269	498	866	316	163	91	2,385	6,556	8,941	1.30	0.76
(%)	(0.8)	(6.8)	(11.3)	(20.9)	(36.3)	(13.2)	(6.8)	(3.8)	(100.0)				
平均	6.59	5.82	5.18	6.17	7.31	7.87	7.39	7.38	6.82	6.76	6.78		
標準偏差	2.28	2.42	2.06	2.48	2.36	2.42	3.00	3.28	2.60	2.80	2.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査