

表 4329 PD Kt/V APD使用の有無別（腹膜透析患者）

APD使用の有無	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	12	104	146	252	433	161	82	39	1,229	1,727	2,956	1.25	0.72
(%)	(66.7)	(65.0)	(57.5)	(52.7)	(51.2)	(52.1)	(51.3)	(43.3)	(53.1)	(54.8)	(54.1)		
あり	6	56	108	226	413	148	78	51	1,086	1,424	2,510	1.37	0.82
(%)	(33.3)	(35.0)	(42.5)	(47.3)	(48.8)	(47.9)	(48.8)	(56.7)	(46.9)	(45.2)	(45.9)		
合計	18	160	254	478	846	309	160	90	2,315	3,151	5,466	1.31	0.77
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		1		1		1			3	32	35	1.00	0.82
記載なし	1	2	15	19	20	6	3	1	67	3,373	3,440	1.14	0.49
総計	19	163	269	498	866	316	163	91	2,385	6,556	8,941	1.30	0.76

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査