

表 4344 PD Kt/V 使用透析液の種類別（腹膜透析単独患者）

使用透析液の種類	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5%液のみ	4	57	120	243	255	84	65	29	857	1,234	2,091	1.21	0.66
(%)	(0.5)	(6.7)	(14.0)	(28.4)	(29.8)	(9.8)	(7.6)	(3.4)	(100.0)				
1.5%液と2.5%液の併用	1	20	26	26	90	37	15	15	230	335	565	1.44	1.11
(%)	(0.4)	(8.7)	(11.3)	(11.3)	(39.1)	(16.1)	(6.5)	(6.5)	(100.0)				
2.5%液のみ		5	5	8	12	4	4	3	41	85	126	1.27	0.70
(%)		(12.2)	(12.2)	(19.5)	(29.3)	(9.8)	(9.8)	(7.3)	(100.0)				
4.25%液のみ(イコデキストリンなし)						1	2		3	4	7	2.03	0.12
(%)						(33.3)	(66.7)		(100.0)				
イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)		3	5	4	3	1		1	17	34	51	0.89	0.59
(%)		(17.6)	(29.4)	(23.5)	(17.6)	(5.9)		(5.9)	(100.0)				
1.5%+イコデキストリン	4	13	35	92	187	58	26	16	431	574	1,005	1.34	0.58
(%)	(0.9)	(3.0)	(8.1)	(21.3)	(43.4)	(13.5)	(6.0)	(3.7)	(100.0)				
1.5%+2.5%+イコデキストリン		12	9	18	83	39	15	13	189	177	366	1.61	1.13
(%)		(6.3)	(4.8)	(9.5)	(43.9)	(20.6)	(7.9)	(6.9)	(100.0)				
2.5%+イコデキストリン	1	3	11	24	52	23	12	2	128	166	294	1.37	0.52
(%)	(0.8)	(2.3)	(8.6)	(18.8)	(40.6)	(18.0)	(9.4)	(1.6)	(100.0)				
4.25%液+イコデキストリン			1					1	2	1	3	1.70	1.84
(%)			(50.0)					(50.0)	(100.0)				
合計	10	113	212	415	682	247	139	80	1,898	2,610	4,508	1.32	0.77
(%)	(0.5)	(6.0)	(11.2)	(21.9)	(35.9)	(13.0)	(7.3)	(4.2)	(100.0)				
不明			14	11	8	2			35	13	48	0.99	0.37
(%)			(40.0)	(31.4)	(22.9)	(5.7)			(100.0)				
記載なし		3		3	3		1		10	2,622	2,632	1.02	0.64
(%)		(30.0)		(30.0)	(30.0)		(10.0)		(100.0)				
総計	10	116	226	429	693	249	140	80	1,943	5,245	7,188	1.31	0.77
(%)	(0.5)	(6.0)	(11.6)	(22.1)	(35.7)	(12.8)	(7.2)	(4.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査